

Distributio. In Malaya. In Asia occidentali. In omni Europa : et in fere tota orbe terrarum inquilina.

Var. β . *parvulus*. Caulis 6-pollicaris : folia et capitula minora. Involucrum et achænia eadem.

Hab. A Lahore misit Dr. Stewart.

(3.) *Sonchus Hotha* nov. sp.

Folia caulinata oblongo-lanceolata, basi sessilia cordata auriculis brevibus sed acutis. Capitula anguste cylindrica c. 6 flora, glabra. Phyllaria interiora c. 6 valde angusta basi post anthesin incrassata, exteriora parva. Achænia vix compressa utrinque angustata multi-striata lævia fusca. Pappus albus.

Hab. In Hotha in Burma superiore leg. Dr. T. Anderson.

Hæc species a Kurz ad Prenanthidem relata est. Phyllaria basi post anthesin incrassata : et folia omnino Sonchi.

(4.) *Sonchus arvensis* L. in Koch Synops. Flor. Germ. p. 371 DC. VII. p. 187 *Sonchus Wightianus* DC. VII. p. 187 Wight Icon. t. 1142 *Sonchus orixensis* Roxb. Flor. Ind. III. p. 402.

Folia lanceolata runcinata, caulinata sessilia basi cordata, suprema integra. Pedunculi cum phyllariis glandulosi-pilosii. Achænia vix compressa costis crassiusculis transverse muricatis.

Hab. In Bengaliam ; prope Calcuttam. In omni Himalaya sparsa. In montibus Nilgherry.

Var. β . Phyllaria glabriuscula. Ad Lahore leg. Dr. Stewart et Dr. Brandis.

Distributio. In cultis Europæ et Asiæ. In America inquilina.

MICRORRHYNCHUS Less. (Bth. Gen. 756.)

(1.) *Microrrhynchus asplenifolius* DC. VII. p. 181. *Prenanthes dichotoma* Wallich Cat. 3275 *Prenanthes asplenifolia* Roxb. Flor. Ind. III. p. 404.

Glaber. Caules erecti nudiusculi dichotomi. Folia radicalia oblonga pinnatifida runcinatave lobis obtusis. Capitula subpaniculata. Achænum oblongum, basi et apice truncatum, costis crassis rugosis 10-12 longitudinaliter striatum. Pappus albus.

Hab. In Bengaliam vulgaris : mensibus Jan.-Jun. præcipue florens. In Madras ; in planicie Gangetica superiore et Punjab.

(2.) *Microrrhynchus secundus* i. e. *Chondrilla secunda* Royle