

12. *S. CALCITRAPIFLORA*: foliis inferioribus lyratis: lacinia oblongis mucronatis, superioribus pinnatifidis. *V. S.*

Hab. in Afr. bor., Oriente. 24. D. intr. 1803.

13. *S. ASPERA Desf.*: foliis lanceolatis dentato-pinnatifidis asperis, pedunculo nudo, floro longissimo.

Hab. in Oriente. 24. F. intr. 1807.

14. *S. LACINIATA*: foliis inferioribus pinnatifidis linearibus, superioribus linearibus, calycibus glabris: squamis inferioribus patulis mucronatis. *W. Sp.*

Hab. in German., Gall. ♂. D.

15. *S. OCTANGULARIS*: foliis inferioribus decursive pinnatifidis lanceolatis, superioribus lineari-lanceolatis, calycibus inapertis octangularibus. *W. Sp.*

Hab. in Eur. austr. ♂. D. intr. 1805.

16. *S. MURICATA*: foliis inferioribus linearibus, superioribus pinnatifidis, foliis remotis linearibus. *Dec. S.*

Hab. Pedemonti. 24. D. intr. 1809.

17. *S. ELONGATA*: foliis subtus tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis pinnatis, caulis subramosis foliosis. *W. Sp.*

Hab. in Græcia. 24. F. intr. 1802.

908. SONCHUS.

1. *S. MARITIMUS*: pedunculis subsolitariis terminalibus nudis, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. *W. Sp.*

Hab. in Eur. austr., Afric. bor. 24. F. intr. 1806.

2. *S. QUERCIFOLIUS*: pedunculis subdichotomis subsquamosis, calycinis squamis adpressis, foliis oblongis sinuatis dentatis, caule fruticoso. *W. Sp.*

Hab. in Barbar. 24. F. intr. 1812.

3. *S. FRUTICOSUS*: pedunculis ramosis subsquamosis, calycibus squarrosis, foliis lanceolatis runcinatis, caule fruticoso. *W. Sp.*
Hab. in Madera. H. T. intr. 1796.
4. *S. HYOSERICIFOLIUS mihi*: floribus corymbosis, pedunculis ramosis, calycibus levibus arcte imbricatis, foliis lanceolatis pinnatifidis glabris: lobis angulatis dentatis obtusis, caule fruticoso.
Hab. — — H. F. intr. 1809. ex Angl. sub. nom. S. pinnati.
5. *S. ACIDUS*: peduncul. ramosis nudis, calycinis squamis patulis, foliis pinnatifidis: laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. *W. Sp.*
Hab. in Marocco. H. F. intr. 1795.
6. *S. PALUSTRIS*: pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. *Lin.*
Hab. in Europ. paludos. 2. D.
7. *S. ARVENSIS*: pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *W. Sp.*
Hab. in agris Europ. 2. D. intr. 1796.
8. *S. LACERUS*: pedunculis subtomentosis umbellatis, calycibus glabris, foliis pinnatifidis dentatis basi auriculatis cordatis. *W. Sp.*
Hab. — — O. D. intr. 1807.
9. *S. ULIGINOSUS*: pedunculis calycibusque subtomentosis, foliis subruncinatis spinuloso-dentatis amplexicaulibus, radio disco longiore, seminibus oblongis sulcatis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in cultis Eur. O. D.
10. *S. OLERACEUS*: pedunculis subhispidis, calycibus glabriusculis, foliis subruncinatis spinuloso-dentatis amplexicaulibus, radio discum subaequante, seminibus ovalibus compresso-planis. *Bieb. l. c.*
Hab. in cult. Eur. O. D.