

- Avilae* Kunth. 110. H. caule simplici ferrugineo-hirsutissimo, foliis subsessilibus lanceolatis remote dentatis subtus canescentibus, floribus paniculatis, anthodio glabro. *Caracas.*
- asperinum* Don. 111. H. caule erecto tereti hispidissimo, foliis lanceolatis obtusis sinuato-dentatis subtus setosis, floribus corymbosis. *Nepal.*
- † *turbinatum* * 112. H. caule simplici erecto foliisque basi auriculatis amplexicaulibus runcinato-pinnatifidis villosis, seminibus turbinatis. *Pyren. m.* (Lepicaune turbinata Lapeyr.)

2880. SONCHUS.

* *Fruticosi.*

- squarrosus* Cand. 1. S. foliis sinuato-repandis, inferioribus sublyratis, floralibus subintegris, paniculae laxae ramosae pedicellis glabriusculis, squamis anthodii apice patulis. *Madera.* (S. fruticosus L. suppl.)
- quercifolius* Desf. 2. S. foliis oblongis subcarnosis sinuatis duplicato-dentatis, pedunculis 2fidis glabris subsquamosis, squamis anthodii acutis erectis. *Numidia.*
- Jacquini* Cand. 3. S. foliis oblongis sinuato-pinnatifidis acuminatis calloso-ferrulatis, pedunculis corymbosis subtomentosis, squamis anthodii obtusiusculis appressis. *Teneriffa.* (S. fruticosus Jacq. S. congestus W., abbreviatus Link. var. humilior.)
- radicatus* Ait. 4. S. foliis inferioribus sublyratis utrinque laevibus subtus glaucis, laciniis deltoideo-ovatis, caule superne nudo, pedunculis ramosis glabris, squamis anthodii patulis. *Madera.*
- glaucus* W. 5. S. foliis runcinato-pinnatifidis denticulatis subtus glaucis, laciniis ovatis obtusis, pedunculis dichotome ramosis, squamis anthodii patulis acutis. *Mauritania.*
- acidus* Schousb. 6. S. foliis profunde pinnatifidis utrinque concoloribus, laciniis parallelis lanceolatis acutis integerrimis, paniculae ramis rigidis apice incrassatis. *Mauritania.*
- laevigatus* W. suppl. 7. S. foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis subdentatis, terminali acuminata, corymbo diffuso, squamis anthodii apice reflexis. *Inf. Canar.* (S. lyratus W. suppl. neutiquam differt.)
- gummifer* Link. 8. S. foliis amplexicaulibus basi auriculatis pinnatifidis, laciniis deltoideis dentatis, pedunculis divaricatis, anthodii gummiferi squamis marginatis. *Inf. Canar.* Buch.
- lyoserifolius* Hornem. 9. S. foliis decursive pinnatis, foliolis inferioribus lanceolatis angulatis superioribus lineari-lanceolatis subdentatis, paniculae ramis laxis divaricatis, squamis anthodii appressis laevibus. *Madera.*
- pinnatus* Ait. 10. S. foliis decursive pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis acuminatis elongatis integerrimis, floribus paniculatis, squamis anthodii erectis acutis. *Madera.*

- raseus* Bell. 43. S. caule ramofo foliisque basi cordatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis divaricatis lineari-lanceolatis cuspidatis subintegerrimis, pedunculis tomentosis corymbosis, anthodiis glabris. *Podolia*.
- pectinatus* Cand. 44. S. caule ramofo, ramis pedunculis anthodiisque glanduloso-hispidis, foliis basi lata auriculatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis linearibus cuspidatis integerrimis, pedunculis subpaniculatis divaricatis. *Gallia provinc.*
- scorzoneræformis* Lag. 45. S. foliis decursive pinnatis, foliolis linearibus, pedunculis squamosis 1floris, squamis anthodii margine scariolis. *Hispan. austr.*
- italus* * 46. S. foliis decursive pinnatis glabris, laciniis rhombeis denticulatis deorsum versis, petiolis basi auriculatis, pedunculis subcorymbosis anthodiisque glanduloso-hispidiusculis. *Ad Pauphlypum Neapol. et in Sicilia.*
- angustifolius* Desf. 47. S. subcaulis, foliis pinnatis glaberrimis glaucis subcarnosis, foliolis linearibus dentatis, pedunculis squamatis, anthodio glabro. *Numidia.*
- tenerrimus* 48. S. caule ramofo foliisque 2pinnatifidis glabris, laciniis angulatis obtusis petiolisque basi dilatatis auriculatis, anthodiis tomentosis demum turgidis. *Gallia austr.* (Cultu tomentum anthodii et dentes foliorum fere amittit.)

2881. BORKHAUSIA Böhm. (Barckhausia Mönch.)

* *Foliis indivisis.*

- muricata* * 1. B. caule ramofo superne setoso, foliis pilosis, radicalibus obovatis petiolatis dentatis, caulinis sagittatis subintegerrimis, floribus corymbosis, anthodiis muricatis hispidis. *Helvetia. Lachenal. Cyprus. Sibth. Afric. bor. Cella.* (Crepis muricata Sm., Crepis n. 32. Hall. Stirp., Gr. nudiflora Viv.)
- versicolor* * 2. B. caule erecto foliisque lanceolatis elongatis acutis repandis glabris, radicalibus longe petiolatis, caulinis sessilibus, involucri foliolis albo-marginatis. *Dauria.* (Lagoforis versicolor Fisch.)
- bellidifolia* Cand. 3. B. glaberrima, caule ascendente paucifloro, foliis radicalibus spathulato-oblongis subintegerrimis, caulinis sagittato-oblongis, involucri anthodii subfarinoso. *Corfica.* (Crepis bellidifolia Loif.)
- † *Suffreniana* Cand. 4. B. caule erecto basi piloso, foliis radicalibus oblongis sinuatis, caulinis paucis sessilibus linearibus, involucri farinoso. *Gallia provinc.* (Crepis bellidifolia var. Loif.)
- spathulata* * 5. B. caule erecto glabro superne nudiusculo, foliis radicalibus spathulato-oblongis deorsum dentatis, caulinis lineari-lanceolatis acutis, ramis