

(208) SONCHI FRUTICOSI. Omnes habitant Mauritaniam, Maderam aut Teneriffam et nunc septem hujus sectionis species seu in hortis seu in herbariis nostris numerantur, quarum hic brevem monographiam adjungere lubet, ut certius Souchi congesti et Sonchi Jacquinii caracteres videantur.

1. SONCHUS SQUARROSUS.

S. caule fruticoso, foliis sinuato-repandis, inferioribus sublyratis, floralibus subintegris, panicula laxa ramosa, pedicellis glabriusculis, involueri squamis apice patulis.

Sonchus fruticosus, Lin. f. supl. 346. Ait. Kew. 3. p. 115. L'Her. stirp. nov. p. 171. t. 81. Lam. dict. 3. p. 399. Wild. spec. 3. p. 1511. excl. syn. Jacq.

Habitat in rupibus altis Maderæ, Masson. (v. v.)

Variat foliis lyratis, sinuato-repandis, integrisque? An duæ species buc confusæ?

2. SONCHUS QUERCIFOLIUS.

S. caule fruticoso, foliis oblongis sinuatis dentatis, pedunculis subdichotomis glabris subquamosis, involueri squamis adpressis subacutis.

Sonchus quercifolius, Desf. fl. atl. 2. p. 225. t. 213.

Hab. in Barbaria in montibus Cafsæ, Desfontaines. 5. o.

3. SONCHUS JACQUINI.

S. caule fruticoso ramoso, foliis lanceolatis runcinatis acuminatis serratis, serraturis crebris callosis, pedunculo dense folioso, umbellæ pedicellis tomentosis sæpius bifidis, involueri squamis adpressis obtusis.

Sonchus fruticosus, Jacq. coll. 1 p. 83. Icon. rar. 1. t. 161. opt. excl. syn.

Habit. in rupibus insulæ Teneriffæ. Masson. 5. (v. v.)

A S. squarroso differt foliorum forma, floribus umbellatis, pedicellis tomentosis, calycibus adpressis, etc.

4. SONCHUS CONGESTUS.

S. caule fruticoso simplici, foliis lanceolatis runcinatis acuminatis serratis, serraturis crebris callosis, pedunculo pareo folioso, umbellæ pedicellis tomentosis simplicibus, involueri squamis adpressis obtusis.

Sonchus congestus, Wild. in naturforc. magaz. 1807. p. 135.

Hab. in Teneriffa, Broussonnet. 5. (v. v.)

Differt a S. Jacquinii cui simillimus, caule humili simpli-