

Crescit circa *Memessah* (Quartin Dillon), mense Septembre et in agris prope *Sabra*, mense Martio (Schimper).

*Observation.* — J'ai comparé les échantillons d'Abyssinie avec le *Picridium tingitanum* recueilli en Égypte par M. Delile, et j'ai vu qu'ils n'appartenaient pas à la même espèce. Ces échantillons m'ont offert tous les caractères du *Picridium arabicum* Hochst., autant du moins que j'en ai pu juger par le caractère qui en est tracé par De Candolle, n'ayant pas eu occasion de voir les échantillons-types de cette espèce.

SONCHUS. Cassin., *Dict.*, XXV, 151; DC., *Prodr.*, 184.

SONCHUS OLERACEUS. L., *Sp.*, 1116.

S. caule erecto, ramoso, tereti, glabro, glauco : foliis caulinis sessilibus semiamplexicaulibus, incisus aut argute dentatis, glabris; akeniis oblongis subcompressis, lævibus aut striato-subtuberculatis.

Crescit in pluribus Abyssiniæ provinciis (Quartin Dillon, Petit, Schimper, Rüppell).

SONCHUS MELANOLEPIS. Fresen., in *Mus. Senckenberg.*, III, 76; C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, 1242.

S. caule basi lignoso, ramoso, 6-12 uncias alto; foliis runcinatis subtus glaucescentibus basin versus attenuatis ibique auriculato-amplexicaulibus, lobis oblongis parce et inæqualiter dentatis; capitulis cylindræis in apice ramorum subfiliformium geminis ternisve, breviter pedunculatis, folio anguste lineari subintegro basi late auriculato suffultis, involucris nigricantibus basi pedunculisque tomentosus, carina squamarum nigro-setosa, akeniis compressis striatis, striis transverse rugulosis.

Crescit in monte *Bouahit*, prope *Demerki*, in provincia *Semiène*, mense Augusto florens (Rüppell, Schimper).

*Observation.* — Cette espèce a quelque analogie avec le *Sonchus lævigatus*, Willd., mais elle est plus petite, et les écailles de son capitule sont couvertes de poils noirs et laineux.

SONCHUS LACTUCOIDES. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, n° 1299.

S. caule basi suffrutescente erecto, ramoso bipedali, ramis graci-

libus, glabris foliis lanceolato-linearibus acutis longissimis margine distanter et obsolete denticulatis capitulis teretibus parce numerosis ima basi tomentosus; involucri squamis subimbricatis, externis lanceolatis brevioribus laxiusculis subacutis, internis oblongo-lanceolatis obtusis, glabris; akeniis compressis striatis, vix scrobiculatis; pappi albidi subsessilis setis gracilibus mollibus vix denticulatis; pedunculis glabris, aut piloso-setosis.

Crescit in dumetis prope *Tchénausa*, mense Januario ad Aprilem florens (Schimper).

*Observation.* — Le nom spécifique de *Lactuoides*, imposé à cette espèce, lui convient très-bien, car elle ressemble tout à fait à une espèce du genre *Lactuca*. Elle se distingue facilement dans le genre *Sonchus* par ses feuilles lancéolées, presque linéaires, longues souvent de trois à quatre pouces, finement denticulées dans leurs bords.

DIANTHOSERIS. C. H. Schultz, in *Flor. bot. zeit.*, XXV, II, n° 439.

DIANTHOSERIS SCHIMPERI. C. H. Schultz, in *pl. Schimp. Abyss.*, sect. II, n° 775.

*D. acaulis*, pumila : caudice crasso, perpendiculari, simplici, nigro; foliis radicalibus rosellatis numerosissimis spatulato-oblongis obtusis aut subacuminatis, basi in petiolum infra dilatato-amplexicaulem margine purpurascentem attenuatis, integris aut obsolete subdenticulatis glabris : capitulo sessili foliis quasi involucrato; involucri squamis erectis oblongo-lanceolatis 1-serialibus coloratis, acutis glabris.

Crescit in regione superiori montis *Bouahit*, altitudine circiter 12,000-13,000 pedum supra mare, mense Augusto florens (Schimper).

*Observation.* — Plante singulière, d'un port tout spécial et caractéristique. Je n'ai vu qu'un seul petit échantillon des collections de M. Schimper.