

Chondrillis affinis quædam laciniata an trincatella. J. B. II.

1021.

Ses racines sont napiformes & paroissent vivâces, quoique tous les auteurs la disent annuelle? Les tiges se ramifient dès leur base, & se prolongent par plusieurs pédoncules garnis de quelques écailles blanchâtres, membraneuses & cordiformes à leur base. Les feuilles inférieures sont fort découpées, quelquefois sinuées, rongées, d'autres fois entières; les supérieures sont entières & entourent la tige par leur base. Toute la plante est glabre, tendre & un peu cendrée; elle vient dans les pays tempérés, à Vienne, au Buis, à Orange, &c.

Obs. Le port & les caractères de cette plante l'éloignent totalement des Scorzoneres & la rapprochent des Sonchus.

2. *SONCHUS lævis. Camer. Epit. 279.*

SONCHUS foliis amplexicaulibus dentatis integris & semipinnatis, calicibus lævibus. Hall. n. 21. *

Sonchus lævis minor paucioribus lacinis. C. B. pin. 124. T. inst. 475.

A. *Foliis integris. Hall.*

B. *Foliis petiolatis, petiolo serrato foliaceo, segmento maximo terminali. Hall.*

C. *Foliis petiolatis, pinnarum paribus pluribus; extremo segmento triangulari circumferrato. Hall.*

*Sonchus foliis lævibus & teneris, calicibus glabris. Hall. Enum. Stirp. 753. n. 3. **

3. *SONCHUS asper. Dod. Pempt. 643. Fuchs. hist. 674.*

SONCHUS foliis amplexicaulibus rigidiusculis, integris & semipinnatis dentatis calicibus lævibus. Hall. hist. n. 22. * *Enum. 752. n. 2. * cum synonym.*

A. *Foliis integris per oram serratis. Hall.*

Sonchus asper non laciniatus, foliis dipsaci vel lactuæ. T. inst. 474.

B. *Petiolo foliaceo serrato, pinnis triangularibus. Hall.*

Sonchus asper laciniatus foliis dentis leonis. T. inst. 475.

C. *Sonchus intermedius, pilis in calice glandulosus.*

Les variétés de ces plantes sont très-multipliées &