

1821. *S. Plumieri* L. panicula glaberrima fastigiata aphylla, foliis runcinatis subtus glaucis. Praecedente robustior 3 — 4 pedalis, flor. coerulei, pallidiores, duplo majores; achenia

Lactucae video, complanata. — *Auf Voralpen im Vallis: v. Charp. u. a. O. in der Schweiz, Savoyen, angeblich am Ballow bei Basel.* — Juli. Aug. ♂ vix 4

b. *Sonchus* H. Cass. flores flavi:

1822. *S. tenerrimus* L. pedunculis hispidulis umbellatis, foliis inferioribus runcinatis lobo terminali deltoideo, reliquis lineari-bipinnatifidis basi inciso-dentatis. *Pluck. t. 93. f. 3. Rchb. hort. t. 139.* Folia superiora e basi lata cordata-sagittata lineari-acuminata. — *An Dämmen, Gräben, am Fusse der Berge im Vicentinischen, in Hetrurien, im südlichen Piemont um Genua, Nizza: v. Charp.* — Mai. Juni. ♂

dis subumbellatis, foliis runcinatis basi profunde sagittatis denticulato-spinulosis, radice ramosa. *Engl. Bot. 935. Fl. D. 1109. Schk. t. 217. fruct. Curt. Lond. II. t. 164. Clus. CXLVII. fig. infera.* Homine altior, strictus, superne nigro-hispidus, achenia pallide testacea prismatico-tetragona, tenuissime reticulata, pappus maturum achenium aequans! — *In Sümpfen im Norden sowohl (Niedersachsen) als im Süden, im mittlern Gebiete selten und oft mit folgenden verwechselt.* — Jul. Aug. ♂

1823. *S. oleraceus* L. pedunculis junioribus floccoso tomentosus umbellatis, anthodiis glabris, foliis opacis oblongis lyrato-runcinatis integrisve amplexicaulibus sinuato-denticulatis, acheniis sulcatis margine dorsoque transverse rugosis. *Engl. Bot. 843. Fl. D. 682. Schk. t. 256. fruct. Curt. Lond. t. 167. Hayne Arzng. 1. t. 48. S. laevis Vill. Hieracium oleraceum Scop.* Jam folia primordialia plerumque lyrata sunt, lobo terminali maximo, omnia multo tenuiora quam sequentis, subtus glaucescentia, tota planta laxior. — *Var. S. lacerus W. foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis subincisis dentatisque.* — *Auf bebautem Boden.* — Mai — Nov. ☉ ♂

1827. *S. arvensis* L. pedunculis anthodiisque glanduloso-hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis denticulato-spinulosis, radice repente. *Engl. Bot. 674. Fl. D. 606. Schk. 217. fruct. Curt. Lond. II. 163. Hieracium arvense Scop.* Bipetalis et ultra, superne viridi-hispidus, glandulosus; in humidis palustribus interdum homine altior et pro *S. palustri* sumtus, nusquam foliis distincte sagittatis, distinguendus, imprimis acheniis nigris rotundato-compressis granulosis, pappo duplo longiore. — *Auf Thon, lehm- und kalkhaltigen Aeckern.* — Juni-Aug. 4

1824. *S. asper* Hall. pedunculis anthodiisque glabris, foliis lucidis ovato-oblongis integris spinuloso-dentatis, dentibus alternis minoribus, acheniis utrinque tristriatis interstitiis laevibus, margine alato. *Schk. 256. fruct. S. spinosus Lam. S. rigidus Fl. D. 843. S. fallax Wallr.* Rigidus, folia crassiora, auriculae cochleato-contortae; pedunculi interdum glanduloso-hispidi. — *Auf bebautem Boden.* — Mai — Nov. ☉ ♂

1828. *S. maritimus* L. pedunculis subsolitariis terminalibus nudis, foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus indivisis retrorsum acute dentatis. *All. ped. t. 16. f. 2.* Gracilis, pedalis et ultra, achenia spadicea, costae laeviusculae. — *Am Strande der Ost- und Nordsee, bei Venedig: Jan, bei Nizza.* — Jul. Aug. 4

† 1825. *S. parviflorus* Lej. pedunculis elongatis corymbosis glabris, anthodiis subcylindricis setosis, foliis amplexicaulibus runcinato-pinnatifidis spinuloso-dentatis, acheniis laevibus glabris. — *Non vidi.* — *Bei Verviers nach Lejeune.* ☉

1829. *S. littoralis* Rchb. glaberrimus, pedunculis subracemosis, anthodii squamis inferioribus ovato-acuminatis, foliis radicalibus lanceolatis eroso-runcinatis caulisque cordato-acuminatis spinulosis. Anthodii squamis a proximo, sed umbelligero *S. uliginoso* MB. pariter a *S. longifolio* Trev. qui annuus est, et ped. tomentosus umbellatos refert, nec minus a multo teneriore *S. maritimo* differt. — *Im Friaul, am Meere bei Monfalcone: Heynhold.* — Jun. 4

1826. *S. palustris* L. pedunculis anthodiisque nigro-glanduloso-hispidis

CCCLII. *Picridium* Dsf. *Bitterlattich.* Anthod. imbricatum urceolatum, squamis margine membranaceis. *Rec. nudum. Achen.*