

Zoll. l. c. p. 125. — *S. sundaicus* Bl. Bijdr. p. 855. — *S. oleraceus* Wallroth. — *Carduus amplexicaulis* Noronha Verh. Bat. Genootsch. V. — Specimina javanica a me examinata formam integrifoliam (WALLROTH) spectant. — Alia etiam vidi depauperata, in montanis Ungaran Javae lecta, foliis obovato-oblongis integris, caulis oligocephalis, achaeniis quasi multi-nerviis (nervulis medio sulcatis), in nervis et inter eos rugulosis.

Sumatra. Java, bijv. bij Krawas, op den Merbaboe, op de korenvelden (ZOLL. JUNGH.).

2. **Sonchus asper** VILL. Charact. partim praeced. sed auriculae rotundatae, involucrum basi cum pedicello saepe subhispidulum, achaenium laeve utrinque trinervulum. *Sonchus asper* Vill. Delph. III. p. 158. — *S. spinosus* Lam. non DC. — *S. oleracei* var. LINN. et auct. — *S. fallax* Wall. Sched. crit. p. 432. — Specimina javanica foliis runcinato-sinuatis ciliato-dentatis longe cuspidato-acuminatis; achaenia lateribus laevibus, marginibus scabriusculis. *Sonchus cuspidatus* Bl. Bijdr. p. 855.

Beide in Europa algemeen verspreide onkruiden, komen thans ook in de keerkringslanden, in Indië enz. voor. Java, op de bebouwde plaatsen, op den Gedé, Diëng. — Djekken jav.

3. **Sonchus malaianus** MIQ. Erectus, glaber, caule tereti superne subangulato ramoso, cavo, folia sessilia erecta e basi cordato-sub hastata latiuscula lanceolata acuminata coriacea glauca minute spinulosodenticulata, 14—2 poll. longa, suprema basi magis dilatata, corymbus laxus terminalis, pedicelli solitarii vel saepe umbellati, nascentes subpuberi, adulti glaberrimi, involuci nascentis subfloccosi mox glaberrimi squamae extimae ovatae, ovales, reliquae lanceolato-lineares, glabrae laeves, achaenium compresso-subtetragonum striato-sulcatum et transverse rugulosum. *Sonchus javanicus* (haud Spreng. et auct. sec. icon. Burm. Fl. Ind. tab. 57, fig. 1. *Hieracium javanicum* Burm. l. c. 174, cuius folia multo latiora et ipsum genus dubium) JUNGH. in Nat. en Gen. Arch. II, p. 43, ZOLL. l. c. p. 269. — Neque hoc Prenanthes javanica (Willd.) Bl. Bijdr. p. 887 propter involucra quinqueflora caet. longe diversa.

Java, op de grasvlakten van den Diëng, om Batavia, veelvuldig

in de Angring-wouden op den Merapi (JUNGHUHN). In Soerakarta (HORSFIELD). Blinggit jav. of Kajoe rono (HORSFIELD).

4. **Sonchus oreophilus** MIQ. Caulis et folia exacte praecedentis, sed pedicelli pilis glanduloso-capitellatis, involueri squamae pleraeque carinâ aculeatae, achaenia magis compressa et vix transverse rugulosa. *Sonchus javanicus* (haud Spreng.) Zoll. l. c. II. p. 269 partim. *Schultz partim* in Zoll. Cat. p. 125. Flores lutei. — Specimen mancum, certo autem e separatâ infl. speciem sistit a praeced. distinctam.

Java, op den Ardjoeno 4—7000' (ZOLLINGER). Kajoe rono jav.

XLVI. YOUNGIA CASS. Capitulum circiter 12-rarius 15—20-florum. Involucrum cylindraceum 8-phyllum, squamis accessoriis circiter 5 calyculatum. Receptaculum nudum. Corollae ad apicem tubi pilosae. Achaenia oblonga nunc compressa nunc saepe in iisdem capitulis subtrigona, longitudinaliter striata, erostria, utrinque subattenuata. Pappus pilosus uniserialis filiformis vix subdenticulatus albus. — Herbae pleraeque Indicae, aliae in Mauritio, Japonia vel Sinâ degentes, foliis inf. lyratis pinnatifidis vel grosse dentatis, caulinis paucis, capitulis flavis parvis Lampsanae fere more. Genus propter species (uti *Y. napifolia* DC.) achaeniis apice contractis intime jungitur Brachyrampho nec non Lactucae Sect. Mycete.

1. **Youngia fastigiata** DC. Caulis tenuis subnudus apice subcorybosus, folia inferiora petiolata cum caulis inferioribus tenere subpubera vel subglabra lyrato-runcinata, 3 pollicaria, lobis ovatis mucronato-dentatis, terminali multo majore, suprema subsessilia sinuata acuminata, involucrum 8-phyllum minute (squamulis brevibus ovatis circiter 5) calyculatum 10—16-florum, achaenia (in nervis subpubera) subtrigono-compressa, hinc convexa, illic subacutangula grosse striata, apice attenuata. *Youngia fastigiata* DC. Prodr. VII. 1, p. 193. Zoll. in Nat. en Gen. Arch. II. p. 537. — *Prenanthes fastigiata* Blume Bijdr. p. 836. — *Crepis Schultz* l. c. p. 125.

Java, op vochtige grasvlakten der bergstreken, bij Buitenzorg, enz. (BLUME), op de uitgedroogde rijstvelden bij Pasir Madang, in de Preanger enz. (ZOLLINGER).