

Tun., 266. — *Chondrilla nudicaulis* L., *Mant.*, 278. — *Microrhynchus nudicaulis* Lees., *Syn.*, 139. Pl. Canarienses, nos 232 et 601. Février à mai.

GRAN-CANARIÃ : Las Palmas (Bornm.) ; San Cristobal, Telde, Santa Lucia (700^m).

FUERTEVENTURA : Puerto de Cabras, Lajas, Oliva. : Gran Valle de Jandira (Pto. D. unhand)

LANZAROTE : Haria (300^m). (als Barhàunra

PALMA : Los Llanos (300^m). hieracoides L.

GOMERA : Hermigua (Bourg.) ; San Sébastian (Bornm.) ; Agulo, Valle Hermoso (200^m).

Endroits arides et ensoleillés, alluvions sableuses des barrancos, surtout dans la zone maritime inférieure.

Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne, Marmarique, Égypte, Arabie Pétrée.

Z. spinosa Boiss., *Or.*, III, 825. — *Sonchus spinosus* D C., *Prodr.*, VII, 187; Webb, *It. Hisp.*, 30. — *Prenanthes spinosa* Forsk., *Fl. Æg.-Arab.*, 144. — *Lactuca spinosa* Lam., *Encycl.*, III, 408. Pl. Canarienses, n° 231. Janvier à juin.

TÉNÉRIFE, GRAN-CANARIÃ, LANZAROTE, FUERTEVENTURA : Très abondant.

GOMERA : San Sébastian (Bornm.).

Vulgaire dans les îles centrales et orientales. Falaises, rochers, éboulis rocheux, alluvions des barrancos, dans toute la région maritime inférieure, ensoleillée et sèche.

Algérie.

Sonchus Tourn., *Elem.*, 376, et *Inst.*, 474.

SECT. I. — **Eusonchus** D C.

SÉR. 1. — **Herbacei** D C.

S. oleraceus L., *Sp.*, 1116; Desf., *Atl.*, II, 224; Batt. et Trab., *Alg.*, I, 556; Boiss., *Or.*, III, 795; G. et G., *Fl. Fr.*, II, 324; Bon. et Bar., *Tun.*, 264; Rchb., *Ic.*, XIX, t. 59. Janvier à mai.

Var. α *triangularis* Wallr. — *S. oleraceus* L., var. β *runcinatus* Koch, *Syn.*, 497.

Var. β *lacerus* Wallr. — *S. ciliatus* Lam., *Fl. Fr.*, II, 87. — *S. lacerus* Willd., *Spec.*, V, 1513.

Dans toutes les îles, où il n'est jamais très commun ; lieux cultivés et incultes de la zone maritime inférieure.

Madère, Maroc, Algérie, Tunisie, Europe, Tripolitaine, Cyrénaïque, Égypte, Arabie, Syrie, Asie Mineure.

S. asper Vill., *Hist. Pl. Dauph.*, III, 158; Batt. et Trab., *Alg.*, I, 555; Boiss., *Or.*, III, 796; G. et G., *Fl. Fr.*, II, 324; Bon. et Bar., *Tun.*, 263; Rchb., *Ic.*, XIX, t. 60.

Var. α *inermis* Bisch., *Beitr.*, 222. — *S. fallax*, var. α *lævis* Wallr., *Sched. Crit.*, 432.

PALMA : Los Llanos (200^m).

natus Ait. Mais celui-ci s'en distingue par son port infléchi, ses feuilles plus grandes, à segments plus larges (10 à 15 mm. de larg.), plus ou moins obtus, toujours dentées, ses fleurs plus courtes (10 mm. de long.), les folioles externes du péricline très différentes des internes, plus courtes, et plus largement ovales. Il en diffère enfin par son habitat dans les forêts ombragées et humides d'où il pend dans le vide.

HIERRO : Riscos de Casitas (50 à 100^m).

Rochers maritimes secs et ensoleillés, où nous n'en avons rencontré que quelques rares échantillons.

Espèce spéciale aux Canaries.

S. Canariæ Pitard. Février à avril.

Plante ligneuse : tige de 50 à 80 centimètres de hauteur, dressée, glabre dans toutes ses parties, très rameuse. Feuilles inférieures de 15 à 18 centimètres de long. et 5 centimètres de largeur, *pennatifides, roncinées, à segments peu nombreux* (8 à 10), assez régulièrement opposés, denticulés spinuleux ; feuilles supérieures de moitié plus courtes, *vernissées à leur face supérieure*. *Calathides isolées à l'extrémité des tiges, ou géminées, à pédoncule court* (2 à 3 cm.), *petites allongées* (15 mm. de long. et 5 mm. de larg.), péricline glabre ; folioles externes, courtes, ovales obtuses, folioles internes lancéolées obtuses, assez larges (2 mm. de larg. et 12 mm. de long.). Akènes lisses.

GRAN-CANARIÃ : Barranco de San Felipe, près Guia (150^m).

Falaises rocheuses fraîches et humides qui surplombent la route de Las Palmas à Guia.

Espèce spéciale aux Canaries.

S. neglectus Pitard. Février à avril.

Plante ligneuse : tige de 30 à 50 centimètres de hauteur, dressée, très glabre dans toutes ses parties, rameuse dès la base. Feuilles *courtes* (8 à 10 cm.), *groupées à l'extrémité des rameaux, obtusément lyrées, à lobe terminal large* (4 à 5 cm.), *mesurant la moitié de la longueur de la feuille ; lobes latéraux peu nombreux* (2 ou 3), entiers ou parfois denticulés. Feuilles supérieures embrassant la tige par *deux oreillettes arrondies*. Pédoncule floral à courtes bractées. *Calathides groupées en petit nombre* (4 à 6), de 5 à 6 millimètres de largeur et 13 à 15 millimètres de long. Folioles externes du péricline courtes, acuminées ; folioles internes lancéolées obtuses (13 à 14 mm. de long. et 2 millim. de larg.). Akènes jeunes, lisses.

GRAN-CANARIÃ : Falaises rocheuses du Barranco de San Felipe, près Guia.

Avec le précédent, et, comme lui, assez abondant, quoique plus rare.

Espèce spéciale aux Canaries.

SECT. II. — *Atalanthus* D C.

S. leptcephalus Cass., *Dict.*, 43 ; D C., *Prodr.*, VII, 189 ; Webb et Berth., *Phytogr. canar.*, III, 442. — *Prenanthes pinnata* L. f., *Suppl.*, 347. — *Chondrilla pinnata* Lam., II, 79. Mai à juillet.