

J. F. Tausch *descriptiones plantarum minus cognitarum.*

1. *Sonchus nigricans*: foliis profunde pinnatifidis, laciniis linear-lanceolatis undulato-dentatis margine rachique spinulosis, pedunculis umbellatis confertis anthodiisque nigricantibus subglaberrimis.

Habitat Neapoli ad Pausilippum, unde D. Sieber cum *S. italo Spr.* attulit. ◎

Glaberrimus. Caulis strictus crassus subangulatus. Folia caulina conferta cordato-auriculata amplexicaulia oblonga profunde pinnatifida, rachi laciniis duplo angustiore subaequali spinuloso-dentata, laciniis cuspidatis undulato- et conferte-dentatis et spinulosis, sinubus rotundatis, supra obscure virentibus subtus purpurascentibus, summa floralia linearia sinuato-denticulata. Flores terminales *S. oleraceo* majores. Pedunculi pollicares umbellato-conferti, umbellis multifloris, basi squamis involucratis, et more congenerum proliferis. Anthodium cylindricum nigricans glaberrimum, squamis linear-lanceolatis dense imbricatis. Flosculi lutei concolores. Receptaculum nudum. Pappus pilosus niveus sessilis. Germen minimum ovali-compressum margine alato cinctum. Semen deest.

2. *Crepis Bauhiniana*: caule erecto apice corymboso foliisque lanceolatis hastato-amplexicaulis runcinatis hirtis, pedunculis anthodiisque dense glanduloso-pilosis.