

- Pag. 388. *SCORZONERA LACINIATA*. *Avola (Bianca)*; sotto *S. Filippo di Argirò (Tin. Nym. Guss.)* & *Pedunculus centralis* in var. a. saepe lateralibus brevior in plantis prope *Avola* provenientius (*Bianca*) & *Cl. Moris* in *fl. sard.* 2. p. 496 sub hac plures species associat, uti inter siculas *S. octangularem*, ac *intermediam*, sed in Sicilia ubi longe lateque proveniunt una in alteram non transit, characteresque specificos semper immutatos servare vidi.
389. — *HIRSUTA*. *Castellobuono (Minà)*.
 id. — *DELICIOSA*. Ic. *S. angustifolia*, humilis, radice oblonga monorchide. *Cup. panph. ed. Bibl. Cass.* 2. t. 285 & *Avola* in demissis usque ad litora abunde provenit (*Bianca*); *alla taverna di Manganaro presso Alia (Tin. Nym. Guss.)*.
390. *SONCHUS MARITIMUS*. *Avola (Bianca)*.
391. — *ASPER*. Junio a *Pontecapillo presso Castellobuono (Minà)*. *Callagirone (Gerb. Tar.)* & *Caules* superne, uti *pedunculi*, ac *anthodia hirsuti*, angulati, nitide rubentes, usque $2\frac{1}{2}$ pedales (*Gerb. Tar.*); *folia* saepe profunde spinuloso-denticulata: *flores* magnitudine *S. oleracei*: *semina* compressiuscula, spadicea & Ex synonymis deleantur sequentia: *S. incanus*, *angustifolius*, *crispiori folio*, *rigidioribus spinulis*. *Cup. H. Cath. p. 206*; et *icones panph. 2. t. 129*, ac *Bon. t. 84* ad sequentem spectantia; ideoque post hanc speciem adde:
- 3.^a *S. NYMANNI*. *Tin.*, et *Guss.*
S. glaber, radice perenni repente, foliis obovato-oblongis runcinato-pinnatifidis argute et elongate spinuloso-dentatis, radicalibus petiolatis, caulinis basi cordato-amplexicaulibus rotundatis, pedunculis subumbellatis, caule superne anthodisque piloso-glandulosi glabrisve, seminibus levibus marginatis disco utrinque 5-nerviis, nervis duobus lateralibus invicem approximatis.
S. incanus, *angustifolius*, *crispiori folio*, *rigidioribus spinulis*. *Cup. H. Cath. p. 206*.
 Ic. *S. crispo laciniatoque folio spinoso candicante*. *Cup. panph. 2. t. 129* — *Bon. t. 84*.
 In argillosis humentibus cultis, vel herbosis submontosis; *Vicari lungo la strada regia, Alia (Tin. Nym. Guss.)*.
 Aprili, Majo. 24
Radices firmæ, lactescentes, late repentæ: *caules* robusti, tamen fistulosi, saepe diametro 2-3-lineari, 1-3-pedales: *folia* praesertim juniora ex viridi-glauescentia: *anthodia* saepius glabra, 9-10 lin. longa; foliolis interioribus obtusis: *flores* aurei, majusculi: *semina* omnino praecedentis, ad margines sub forte lente tenuæ ac remote serrulata; sed nervi (qui sic potius dicendi etiam in praecedentibus) sunt quinque non tres.
 Differt a *S. aspero*; floribus duplo majoribus, diametro pollicari et ultra; radice valde repente!; nec ob semina cum *S. arvensi* associandus, a quo omnino alienus.
394. *LACTUCA VIROSA*. *Messina alla Rametta (Prest.)*.
 id. — *SCARIOLA*. In hortis, et in humentibus cultis obvia in *Avola (Bianca)*; *Castellobuono a Liccia (Minà)*.
397. *LEONTODON TARAXACUM*. *Madonie al Ferro (Minà)*.
 id. — *MINIMUM*. *Madonie al Ferro (Minà)*; *Etna fra Pedara*