

E Brasilia. Otto.

C. aspera Thunb. proxima, sed folia pinnata, pinnis dentatis. *Senecio lycopifolius* Desf. Poir. (*enc. suppl. 5. 131.*) caule tomentoso differt et foliis inciso - pinnatifidis, calycibus etiam calyculatis. Flores nostrae plantae lutei.

e. Cichoreae.

79. *Sonchus occidentalis.* *

S. pedunculis bracteosis calycibusque glabris, foliis lanceolatis inciso - serratis subsessilibus.

Ex insulis Antigua, Dominica, Guadalupe.

S. agrestis Sw. simillimus, sed huius pedunculi tomentosi. Noster glabros habet, bracteis linearibus. *Folia glabra, digitalia, lanceolata, inciso - serrata.*

LIX. RUBIACEAE.

80. *Exostemma capitatum.* *

E. floribus capitatis, foliis ovatis coriaceis glabris.

In Perrini collectione, unde Hosackus et Torreyus largiti sunt. Ex America forte meridionali.

Mancum habeo exemplar, cuius flores in capitulum sunt congesti. *Calyx minimus quinquedentatus. Corolla tubulosa, tubo sesquipolllicari striato, limbo quinquefido, lacinii linearibus angustissimis revolutis. Filamenta cum tubo concreta ex-*