

base da fiocchi di tomento caduco; involucrio glabro o raram. con poche setole glandolose. Acheni con 5 costoline per lato, rugose per traverso. ☉, ☉, ☿. *Rupi, muri, tetti, ruderi ecc. della reg. med. nella Pen. dalla Lig. e Marche in giù, grandi e parecchie piccole isole; indicato pure qua e là del Ven., Ossola (ROSSI) ed una volta al Campo Marzio di Trieste. Quasi tutto l'anno. [Eur. medit. As. occ. Afr. bor. Abiss.].*

1 S. tenerrimus L. 3871

A. Fg. pennatifide.

a Pianta bienne.

b Pianta annua, gracile, a fusto unico.

c Pianta perenne, a fusti angolosi.

B Fg. bipennatifide, a lacinie inciso-dentate. — S. tenerr. b. Guss. d. *Gussonei Nob.*

C Fg. bipennatifide, a lacinie strettam. lineari, intere o denticolate. — S. tenerr. c. Guss. e. *italicus (Spr.)*

— Acheni obovati od ellittici, compresso-appianati. Fg. indivise o più spesso roncinate, raram. pennatifide. Fusti eretti, generalm. più grossi e robusti che nel prec. e fortem. angolosi, glabri o muniti in alto di setole glandolose. Fg. polimorfe, le infer. picciolate, le altre sessili o rarissimam. picciolate, ampiam. orecchiate. Capolini ed involucrio c. s. ☉, ☉. [*Diffuso per tutto il mondo*]. — *Hieracium Scop.* — *Volg. Cicerbita, Crespigno.*

2 S. oleraceus L. 3872

A Acheni non marginati, con 3-5 costoline per lato, rugose per traverso. Fg. più spesso molli ed opache, le cauline ad orecchiette patenti ed ordinariam. acute. ☉. *Luoghi colt., macerie, muri ecc. dal mare alla reg. mont. nella Pen., Istria ed isole. Marz.-Aut.* — S. oler. α et β L. — S. ciliatus Lam. (1778). α LEVIS (BARTAL., 1776)

I Involucrio nudo.

a Fg. roncinate-lirate, a segmenti triangolari-oblungi, dentati, il terminale più grande, saettato od astato alla base. — *Comune.* — S. olerac. β runcinatus Koch.

a. *triangularis Wallr.*

b Fg. indivise, bislungo-obovate. — *Piuttosto raro.*

b. *integrifolius Wallr.*

c Fg. pennatifide, a segmenti lanceolati, dentati o sinuati, il terminale poco più grande. — *Abbastanza frequente.*

c. *lacerus (W.)*

d Fg. quasi bipennatifide, a segmenti e lacinie lineari o lanceolate, ricordanti quelle del *S. tenerrimus*. — *Tosc. a S. Ellero (ADR. FIORI), Ischia (GUSS.)* — S. ciliatus c. subipinn. Guss.

d. *subbipinnatifidus Nob.*

II Involucrio munito di setole per lo più glandolifere.

* Fg. come nella for. *triangularis*. — *Faentino (CALDESI).*

e. *Royleanus (DC.)*

** Fg. come nella for. *lacerus*. — *Faentino (CALDESI).*

f. *Royleano-lacerus Caldesi*

B Acheni marginati, con 3 costoline (talora intercalate da 2 minori) per lato, minutam. scabre sotto la lente, ma non rugose. Fg. un po' rigide e lucenti, le cauline ad orecchiette ricurve contro il fusto ed ordinariam. arrotondate. — *Comune col tipo.* — S. olerac. γ et δ L. — S. spinosus Lam. -- S. fallax Wallr. β ASPER (HILL., 1760)

Δ Pianta annue. Fi. giallo-chiari.

1 Fg. indivise, bislungo-obovate od ovali, a denti non pungenti. Involucrio verde, nudo o raram. setoloso-glandoloso. — *Abbastanza frequente.*

a. *inermis Bischoff*

2 Fg. lirato-roncinate, a segmenti oblungi, a denti non pungenti. Involucrio c. s. — *Frequente.*

b. *runcinatus Nob.*

3 Fg. più o meno profundam. lirato-roncinate, dentato- od inciso-spinulose, più rigide e spesso increspate. Involucrio c. s. — *Comune.* — S. Nymanni Tin. in Guss. ¹⁾ — S. arven. v. flocculosus Nym. ex Ces. P. et G.

c. *pungens Bischoff*

1) Nell'Erb. centr. esistono due esemplari di *S. Nymanni*, uno del TODARO e l'altro del PASQUALE ed ambedue sono da riferirsi a *S. asper* c. *pungens*. Il NYMAN (Consp. p. 433) riferisce invece questa spec. a *S. arvensis* v. *uliginosus*, potrebbe quindi aver egli veduto degli esemplari diversi da quelli sopra citati.