

*Sonchus Ortunoi* Svent, nova spec.

Sectio *Dendrosonchus* Webb et Sch. Bip.

**S**UFFRUTEX 30-50 cm. alt. et amplius, multicaulis a basi ramificatus; caulis annotinis, tortuosis, simplicibus vel ramificatis, rudis, nigrescentibus, foliis marcidis densè tectis. Foliis ad apicem caulorum densè rosulatis, 15-20 cm. long., ambitu oblanceolato in petiolum latè alatum, semiamplexicaulem sensim attenuatis, grossè pinnatopartito-lobatis, lobis deltoidei-rotundatis, irregulariter dentatis, margine spinuloso-fimbriato, rhaqui albido, valde incrassato, utrinque glabris; foliis marcidis per multos annos persistentibus. Stipite florali generaliter 20-30 cm. alt., rigido, cylindrico, simplici vel parcè ramificato et folioso, foliis sessilibus, subternè floccoso-araneosis; inflorescentia oligocephala, subcorymbosa, ramulis 5-10 cm. long., aliquando bracteis duabus simplicibus ornatis; capitula 4-5 cm. diam., circa 3 cm. long., verè multiflora; involucro globuloso, 1-2 cm. diam. et densè albo-lanato-floccoso in basi; bracteis involucralibus obtusiusculis, glabris, virido-flavescentibus; externis deltoideis, concavis versus apicem, margine crispato-undulato; intermediis elongato-spathulatis; intimis lineari-paleiformibus; floribus periphaericis 25-30 mm. long., tubo ca. 15 mm. long., angustissimo, albo, in dimidio superiori densè crispato-hispido; ligula ca. 3 mm. lat. maxima, linear-cuneata, apice truncato, dentibus deltoideis munita, glabra in anverso; staminibus 2-3 brevioribus quam ligula; stylo exerto, laciniis stigmae 2 mm. long., spiraliter recurvatis. Achaenio 3.5 mm. long., 1.5 mm. lat., ambitu linear-elliptico, subtriangulari-compresso, transversaliter suberoso-striato-ruguloso, dorso plano-convexo e striis parum notatis, a ventre incrassatè striato; villo biseriali, subtriplo longiori quam achaenium, setis majoribus parcè denticulatis cum alteris fibrillosis abundanter intermixtis.

Floret et fructificat a Martio usque ad Julium.

Habitat inter saxas subumbrosas et in clivis petroso-argillosis.

Locus originis: Junonia Minor (etiam Gomera dicta): in regione austro-occidentale: in profunda valle vulgo dicta "Marandón" versus 600 m. supra mare, ubi legi die 6 Octobris 1956, et in magno cavo Argagae ad 200 m. alt. die 31 Augusti 1957 lecta. In ambo loco sat pauca.

Hanc pulchram speciem cl. Francisco Ortuño Medina amico et benemerito investigatori Florae canariensis grato animo dico.

EXPLICATIO TABULÆ XXXIII

*Sonchus Ortunoi* Svent.

$\alpha$  . Caulis floriger (magnitudine naturali);  $\beta$  . bractea involucralia intima;  $\gamma$  . intermedia;  $\delta$  . exteriora (omnia 2 x auctae);  $\varepsilon$  . flos (2 x);  $\zeta$  . achaenium (4 x auctum).



ER 1958

*Sonchus Ortunoi* Svent.