

*Willemetia apargioides* Cass. In pascuis m. Durmitor jugo Šljeme.

*Taraxacum officinale* Wig. In cultis ad Cetinje, Grahovo.

*T. Hoppeanum* Gris. In rupestribus m. Durmitor, Javorje, Kom; squamiae inferiores basi cordatae, adpressae, ut in *T. commutato* Jord.

*Prenanthes purpurea* L. In sylvaticis m. Durmitor.

*Lactuca viminea* L. In saxosis ad Boljevići distr. Crmnicae.

*L. muralis* L. In saxosis sylvaticis sub m. Durmitor.

*L. perennis* L. In rupestribus m. Javorje.

*Sonchus oleraceus* L. In cultis ad Njegoš, Cetinje.

*S. asper* L. In asperis ad Rijeka, Vir.

*S. pallescens* nov. spec. Caule erecto, simplici, basi glabro, a medio ramoso, ramis glanduloso setosis, umbellato corymbosis, foliis oblongis runcinato pinna-tifidis, margine spinuloso denticulatis, caulinis basi cor-data adnatis, auriculis parte libera flabellatim spinoso dentatis, pedunculis apice floccosis, capitulis ovatis, involuci squammis linearis lanceolatis, carinatis exterioribus ad carinam sparse glanduloso setosis, interioribus glabris, margine late scariosis, flosculis luteis, ligulis exterioribus dorso fascia longitudinali, livida percursis, acheniis oblongo cuneatis, compressis, faciebus 5 costatis, inter costas glabris, costis marginalibus alula angusta, retrorsum denticulata dirempta, pappo achenium bis longo.

Hab. in cultis et ad sepes prope Cetinje. Flor. Julio.

Glaucescenti pallescens, caulis fistulosus, 1—2 pe-dalis, ad ramificationem usque glaber, supra glandu-loso setosus, setis aqueis, glandula atra, depressa ter-

minatis, rami apice subincrassati, floccosi aut senio glabrescentes, capitula magnitudinis *S. tenerrimi*, achenia fusca 0,002 m. l. — *S. glaucescens* Jord. pro quo ad amicos missus, differt statura multo vegetiore, capitulis fere duplo majoribus, acheniis latius alatis; a proximo *S. aspero* abludit statura graciliore, foliis pallidis, capitulis minoribus et acheniis oblongis, angustius alatis.

*S. arvensis* L. In cultis vallis Zetae sub Danilov Grad.

*Mulgedium Alpinum* DC. In pratis sylvestribus m. Durmitor versus jugum Stulac.

*M. Pančićii* Vis. In umbrosis irriguis vallis Tarae.

*M. Plumieri* DC. In pratis sylvestribus sub m. Durmitor versus jugum Stulac, ac in declivibus m. Kukuraj Brdo sub m. Kom.

*Reichardia macrophylla* Vis. et P. In rupestribus et glareosis vallis Tušinae supra Buan et in sassosis m. Vučji Zub — Bijela Gora.

*Zacintha verrucosa* Gaertn. In asperis ad Vir.

*Trichocrepis bifida* Vis. In cultis ad Limljani distr. Crmnicae.

*Crepis foetida* L. In cultis ad Cetinje, asperis ad Vir.

*Cr. setosa* Hall. In campis ad Cetinje.

*Cr. Columnae* Fröhl. In rupestribus m. Durmitor, Javorje ac Vučji Zub.

*Cr. Nicaeensis* Balb. In aggeribus prope Cetinje et asperis ad Nikšićka Župa.

*Cr. virens* Vill. In cultis ad Cetinje, Grahovo.

*Cr. viscidula* Froehl. In pratis sylvestribus sub m. Durmitor versus jugum Stulac.