

subumbellatis, achaenii compresso-subcylindraceis basi non attenuatis secus costas muriculatis. (1) seu (2) in Indiâ orientali ad Hurdwar, Olepur, in Nepaliâ, etc., leger. cl. Wallich et Hamilton. S. longifolius Wall. cat. n. 3251. comp. n. 361 non Trev. S. oleraceus A. Wall. cat. n. 3252. S. Cumbulus Ham. ex Wall. herb. (v. s. comm. ab. hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

13. S. REVERSUS (E. Mey. in Drege coll.), caule erecto tereti, foliis caulinis auriculis acuminatis amplexicaulibus pinnatilobatis, lobis integris angustis acuminatis, foliis summis lanceolato-linearibus indivisis, invol. squamis exterioribus dorso setis reversis hispidis, achaenii muriculato-tuberculosis. (1) in prom. Bonæ-Spei ad Nieuwevelde legit cl. Drege! Rami floridi hispidae. Fol. caulinis nervus medius subtus parcè setigerus. Folia inferiora mihi ignota. (v. s. comm. à cl. inv.)

β. glabratuſ, caulinis foliisque glabris. (1) in prom. Bonæ-Spei territorio cesso legit cl. Ecklon! Folia inf. pinnatilobata ciliato-spinulosa in petiolum latum attenuata, lobis dentatis. Fol. super. lobis angustis integris. (v. s. comm. à cl. inv.)

14. S. TERRIMUS (Linn. sp. 1117), caule erecto tereti glabro aut ad apices piloso-glanduloso, foliis aurito-amplexicaulibus, varie ant sepius bipinnatipartitis, invol. basi tomentosis demum subalvis, achaenii angustis nervulatis transverse tuberculato-rugosis. (1) seu (2) in rupibus secus mare Mediterraneum, in Hispaniâ, Galliâ australiori, Italiâ, Siciliâ, Barbariâ. Stirps tenera polymorpha, praesertim quoad loborum folii formas: sunt nempe linearis oblongi aut ovati, integerrimi aut obtuse dentati, basi decurrentes aut subpetiolulati, unde hue referendi videntur S. lacerus Willd. sp. 3. p. 1503. et S. terrimus auct. Caulinis et rami variant in omnibus foliorum formis, glabri aut glandulosopilosii. An ideo S. italicus Spreng. syst. 3. p. 651, in Siciliâ et ad Pausilippum lectus, huc referendus? — Pluk. alm. t. 93. f. 3. Reichenb. hort. t. 139. opt. (v. v. et s.)

## §. 2. Herbacei perennes.

15. S. PECTINATUS (DC. rapp. voy. 2. p. 58. fl. fr. suppl. p. 434), caule erecto angulato glabro, foliis pectinato-pinnatipartitis, lobis confertis ovato-subtriangularibus acutis integris aut subsinuatis, super. basi auritis, pedicellis vix piloso-glandulosis, invol. piliferis, achaenii teretinsculis obtuse costatis, secus costas tuberculato-rugosis. 2/ in rupibus maritimis agri Ruscinonensis propè Collioure, junio flor. legi, nec in Galloprov. ut vult Spreng. Valde accedit ad S. terrimum, sed radix perennis, caulinis angulatus, etc. (v. v. et s.)

16. S. ANGUSTIFOLIUS (Desf. fl. atl. 2. p. 225), radice fusiformi, caule subnullo, foliis glancis glabris pinnatipartitis, lobis remotis denticulatis, pedunculus squamosis folio brevioribus, invol. squamis albo-mucronatis. 2/ in Manritaniâ circa Cafzam. Capitula magnit. S. arvensis. Achænia ign.

17. S. ULIGINOSUS (Bieb. fl. taur. n. 1578 excl. syn. ex suppl. p. 525), glaber, radice repente, caule erecto tereti, foliis subruncinatis spinuloso-dentatis amplexicaulibus, auriculis subrotundis, invol. glabris imâ basi subtomentosis, achaenii subtetragonis costulatis, secus costas crenulatis. 2/ in campestribus arundinetis et cultis subhumidis Tauria et Ukraniæ (Bieb.), ad Tanaim (Stev.). Trev. repert. nat. cur. berol. 1813. p. 2. p. 153. ex Bieb. S. glaber Schult. obs. 162 non Thunb. S. arvensis var. 1<sup>a</sup>. Bess. gal. n. 923. (v. s.)

18. S. BRACHYXOTUS, caule erecto tereti foliisque glabris spinuloso-dentatis, auriculis brevibus obtusis cordato-amplexicaulibus sinuato-subruncinatis, summis integris, capitulis paucis laxè corymbosis, pedicellis junioribus subtomentosis, invol. squamis exter. ovato-lanceolatis, achaenii oblongis compressis lœvibus subnervulatis. 2/ in campestribus et cultis Sibiriae Altaicae (Ledeb.), et in salsis Daturiae (Turcz.). S. uliginosus Turcz. in litt. Ledeb. alt. 4. p. 142 non Bieb. Differt à S. uliginoso vero auriculis fol. brevioribus, foliis multò minus lobatis, achaenii lœvibus, inv. squamis exter. multò latioribus. Variat fol. inter-