

» 1-3-floris. » Nob: Radix crassissima fibrosissima uti basis caulis rubescens; caulis linearis erectus tenuissime striatus, anthodii squamæ lineares, flores mediocrest lutei (Patria?).

66. *H. heterospermum* Schult: ex hb: Birol: Erectum sub-simplex hispiduscolum, folia oblonga sagittato-amplexicaulia glabrinuscata argute dentata triangulari brevissime ciliata, paniculae divaricatae ramis 1-3-flori, pedunculi apice incrassati sub-nodi, anthodii squamæ simplices erectæ demum naviculares incrassatae, semina dissormia (Patria?). ≡ 67. *H. crassifolium* Schult: sec: Steud: Glaberrimum simplex superne paniculato-ramosum, folia sub-carnosa inferiora lineari-lanceolata longissima sub-denticulata superiora sensim minora integriflora, panicula corymbosa foliosa ramis squamosis sub-3-floris, flores ampliusculi (Patria?).

CLIV. *SONCHUS* Lin: gen: ed: Schreb: n. 1233, = Sp: syst: p. 2880, = Lam: ill: t. 649n. Cladode - foliis  
» Anthodio imbricatim ventricosum, squamis seu la-  
» ciniis inaequalibus margine sub-secariosis? Receptac:  
» nudum. Pappus sessilis non oblongus rotunduplicatus.  
Obs: Genus a Hieracio distinctum præsertim Anthodii forma, habitu magis accedens ad *Lactucam*, constans ex Sp: 45: stipibus quatuor, fruticosæ africanae, ceteræ herbaceæ per orbem sparsæ, foliis indivisis runcinatis vel pinnatifidis, inflorescentia varia.

anthodiisque glabris, corollulae parciores et valde majores.

17. *S. hispanicus* = Jacq: h. Schoënbr: II. p. 9. t. 143. (*Hispania*). Ann: *S. tingitano* n. 12. simillimus, sed tactu glabro, colore glauco, et punctis albidis diversus.

γ Foliis pinnatisidis.

18. *S. chondrilloides* = Desf: atl: II. p. 226. (*Sicil:*, *Numid:*). Perenn: Ramosus undique glaber, foliorum laciniæ lineares remotiusculæ sub-decurrentes, pedunculi elongati incrassati 1-flori, flores amplexicaules. Specim: dubium sub nomine *Scorzonerae resedifoliae* a W. distinctæ, a SPR: conjunctæ cum *S. chondrilloideo*; notandum tamen, figuram Bocconi a W. citatam eandem esse ac illam a DESF: relatam.

\* 19. *S. tenerimus* = L. sp: 1115. = SPR: syst: III. 651. = Pluk: phyt: 93. f. 3. Ic: taur: vol. 18. t. 86. f. 2. (*Gallia* austr:, *Barbaria*, *Italia*. Abunde in comit: *Nicæensi* et *Liguria* ALL: n. 816. *Genuæ* in mœniis præcipue maritimis BERTOL: am: ital: p. 187. *Sardin:* ad vias et muros frequens MORIS st: sard: II. p. 9.). Ann: Ramosus glaber, folia polymorpha, pedunculi et anthodia pilosa.

### *Sonchi dubii.*

α

20. *S. pensylvanicus* = Ex hb: MOLINERI. Glaberimus, folia indivisa petiolata elliptica spinuloso-serrulata, flores paniculati parvi (Patria?). = 21. *S. lon-*

*gisolius?* = Enatus e seminibus missis a cl: BALBISIO sine alia indicatione, valde accedit ad *S. asperum*, a quo differt tantum foliis longioribus basi amplexi-caulibus sub-sinuatis ac evidentius spinuloso-dentatis; statura quoque undique major forsitan ex cultura (Patria?). = 22. *S. chinensis* = Fisch: Ita in scheda ex hb: BIROLI. Planta elata simpliciuscula undique glaberrima, folia indivisa ovato-oblonga in petiolum attenuata acuta inæqualiter sub-dentata, panicula ampla sub-fastigiata, flores flavi (Patria?). = 23. *S. australis* = H. Erf: ex hb: BIROLI. Glaber simplex, folia elongata runcinata laciniis ovatis linearibusve sub-dentatis, pedunculi 1-2-flori, flores flavi (Patria?).

CLV. RODIGIA Spr: syst: n. 2882. = *Crepidis* et *Seriolæ* spec: alior:

» *Anthod*: sub-imbricatum involucratum. *Recept*: paleaceum. *Pappus stipitatus*. »

*Obs*: Genus a SPR: statutum pro 2. tantum stirpibus herbaceis a *Crepide* et *Seriola* divulsis, quarum unam possideo ex hb: BIROLI (*R. lœvigata* SPR: syst: III. 654.; sub *Seriola* L.), Siciliæ et Numidiæ incolam. Herba perenn: scapigera, foliis oblongis spatulatis sub-dentatis glabris, scapo squamuoso, anthodio hirsuto nec glabro uti in phrasi SPR:

CLVI. PRENANTHES Lin: gen: ed: Schreb: n. 1236. = SPR: syst: n. 2883. = Gærtn: sp. II. p. 358. t. 158. f. 1.

» *Anthod*: simplicissimum basi calyculatum. *Recept*: nudus. *Flosculi* simplici serie 5. circiter. *Pappus* sub-sessilis. »