

- α. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. *Bauh. pin.* 124. *lævis*.  
*Sonchus lævis*. *Cam. epit.* 279.
- β. *Sonchus lævis minor*, paucioribus laciniis. *Bauh. pin.*  
 124.  
*Sonchus lævis latifolius*. *Tabern. ic.* 190.
- γ. *Sonchus asper laciniatus & non laciniatus*. *Bauh. pin. asper.*  
 124.  
*Sonchus asper laciniatus latifolius & angustifolius*. *Læs.*  
*pruss.* 257. z. 77. 78.
- δ. *Sonchus asper non laciniatus*. *Tournef. inst.* 474.  
*Sonchus aspera*. *Fuchs. hist.* 674.  
*Habitat in Europæ cultis*. ☉.  
*Folia compresso-amplexicaulia*. *Pedunculi ætate gla-*  
*bri fiunt*.
6. SONCHUS pedunculis tomentosis, calycibus pilosis, tenerrius.  
*Gouan. monsp.* 407.  
*Sonchus lævis* in plurimas & tenuissimas lacinias di-  
 visus. *Bauh. pin.* 124. *prodr.* 61.  
*Hieracium* foliis in tenues lacinias profunde sectis,  
 flore luteo. *Pluk. phyt.* 93. f.  
*Chondrilla lutea*. *Bauh. hist.* 2. p. 120.  
*Habitat* Monspelii, Florentiæ. ☉.  
*Caulis ramosissimus: pilis sparsis, glutiniferis*. *Pedi-*  
*celli albo tomento vestiti*. *Calyces cylindrici: pilis*  
*patentibus adpersi*. *Folia glabra, tenera, pinnati-*  
*fida, inermia*.
7. SONCHUS pedunculis squamosis, floribus racemo- alpinus.  
 sis, foliis runcinatis. *Fl. Svec.* 644; 689. *Gouan.*  
*monsp.* 408.  
*Sonchus* caule erecto, foliis pinnato-hastatis: apice  
 cordato-triangulis, floribus racemosis. *Hort. cliff.*  
 385. \*.  
*Sonchus lapponum altissimus*, floribus cæruleis. *Fl.*  
*lapp.* 290.  
*Sonchus lævis laciniatus cæruleus* f. *Sonchus alpinus*  
*cæruleus*. *Bauh. pin.* 124.  
*Sonchus cæruleus*. *Cam. epit.* 284.  
*Habitat ad latera Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Au-*  
*striæ*. ☉.
8. SONCHUS pedunculis nudis, floribus paniculatis, plumieri.  
 foliis runcinatis.  
*Lactuca alpina glabra*, acanthi folio, flore magno cæ-  
 ruleo. *Vaill. act.* 1721. p. 200. *Monnier. obs.* 157.  
*Habi-*

III 8 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Habitat in Pyrenæis: Monte Aureo prope Carthusiam majorem. Monnier. 2.*

*Similimus S. alpino, sed Corolla unico flosculorum ordine s. flosculis dimidio paucioribus, at quadruplo majoribus. Caulis altitudinis humanæ. Folia bipedalia, Taraxaci runcinata, supra lævia, subtus venis scabra; Caulina angustiora, acutiora. Panicula terminalis: pedunculis nudis. Corolla Cichorii. Calyx exsudat guttulas resinosas, minimas, sparsas.*

floridanus. 9. SONCHUS pedunculis subsquamosis, foliis lyrato-hastatis.

Sonchus caule erecto, foliis pinnato-dentatis: radicibus latissimis obtusis, floribus racemosis. *Roy. lugdb. 129.*

Sonchus annuus canadensis altissimus laciniatus, flore cæruleo. *Vaill. act. 1721 p. 198.*

Lactuca altissima, folio sonchi laciniato, flore parvo cæruleo. *Bærb. lugdb. 1. p. 81.*

*Habitat in Virginia, Canada.*

sibiricus. 10. SONCHUS pedunculis squamatis, foliis lanceolatis indivisis sessilibus. *Hort. upf. 244. Fl. suec. 2. p. 690. Gort. ingr. 119.*

Sonchus foliis lanceolatis sessilibus plerumque denticulatis, floribus corymbosis, caulibus glabris. *Gmel. sibir. 2. p. 11. t. 3.*

Lactuca falicis folio, flore cæruleo. *Amm. ruth. 211. 212.*

*Habitat in Sibiria, Suecia septentrionali, Finlandia. 2. Pappus simplex, sessilis.*

LACTUCA.

quercina. 1. LACTUCA foliis runcinatis denticulatis acutis: subtus lævibus, caule glabro. *It. gotl. 289. \*. Fl. suec. 646; 691. \**

Lactuca foliis quernis. *Raj. hist. 221.*

*Habitat in Insula Carolina Balshici. 2.*

fativa. 2. LACTUCA foliis rotundatis, caule corymboso. Lactuca fativa. *Bauh. pin. 122. Hort. cliff. 384. Hort. upf. 242. Mat. med. 370.*

capitata. 3. Lactuca capitata. *Bauh. pin. 123. Moris. hist. 3. p. 57. f. 7. t. 2. f. 2.*

crispa. 4. Lactuca crispa. *Bauh. pin. 123. Dod. pempt. 644.*

*Habi-*