

incrassatis squamosis, squamis anthodii ovatis appressis. *Gallia austr. Italia. Afric. bor.* (Scorzonera picroides L., Picridium vulgare Desf., Reichardia picroides Roth.)

- tingitanus* Lam. 33. S. caule subramoso, foliis inferioribus runcinatis scabris denticulato-ciliatis, superioribus oblongis sinuato-pinnatifidis, pedunculis incrassatis squamosis, squamis anthodii scariosis squarrosis. *Numidia. Aegypt.* (Scorzonera tingitana W.)
- capitatus* \* 34. S. subcaulis, foliis runcinatis glabris glaucescentibus, laciniis obtusis albo-spinuloso-ciliatis, scapis prostratis sub-1phyllis, floribus terminalibus glomeratis, squamis anthodii ovatis appressis scariosis, seminibus angulatis. *Aegypt.* (Chondrilla capitata Sieber.)
- racemosus* Lam. 35. S. caule simplici foliisque semiamplexicaulibus runcinato-pinnatifidis subtus glaucis glaberrimis, laciniis angulato-dentatis, racemo composito compacto terminali basi foliato, anthodiis laevibus. *Patria?*
- spicatus* Lam. 36. S. caule tereti elato ramoso glabro, foliis runcinatis subtus hirsutis, laciniis angulatis sinuato-dentatis, racemis paniculatis foliatis compactis, anthodiis laevibus. *Amer. bor.* (S. leucophaeus W., Prenanthes autumnalis Walt.)
- floridanus* 37. S. caule tereti elato foliisque petiolatis lyrato-runcinatis utrinque glabris, laciniis oblongis acutis denticulatis, floribus paniculatis, pedunculis subsquamosis. *Amer. boreal.* (S. lapponicus W. excl. syn.)
- alpinus* 38. S. caule simplici inferne glabro, foliis lyratis basi sagittatis glabris, lacinia terminali deltoideo-hastata, racemi terminalis bracteati pedicellis glanduloso-hispidis. *Europ. et Amer. bor.* (S. montanus Lam., coeruleus Sm., lapponicus Frölich., canadensis L.)
- macrophyllus* W. 39. S. foliis lyratis amplis petiolatis subtus hirsutis, petiolis alatis, floribus paniculato-corymbosis, pedunculis hirsutis. *Amer. bor.* (S. canadensis Fröl.)
- Plumerii* 40. S. foliis amplis lyrato-runcinatis subdenticulatis glabris, floribus paniculato-corymbosis, pedunculis 2fidis bracteatis anthodiisque laevibus. *Gallia austr.*

+++ *Foliis pinnatifidis.*

- hispanicus* Jacq. 41. S. caule diffuse ramoso, foliis amplexicaulibus oblongis pinnatifidis glaucis albo-punctato-refinis, pedunculis squamosis incrassatis, squamis anthodii ovatis scariosis subsquarrosis. *Hispania.* (Picridium pinnatifidum Lag.)
- chondrilloides* Desf. 42. S. caule ramoso, foliis dentatis glabris glaucis, inferioribus pinnatifidis, superioribus paucis lineari-lanceolatis, ramis 1floris elongatis, anthodiis laevibus. *Sicilia. Numidia.* (Scorzonera refedaefolia L.)

- roseus* Bell. 43. S. caule ramoso foliisque basi cordatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis divaricatis lineari-lanceolatis cuspidatis subintegerrimis, pedunculis tomentosis corymbosis, anthodiis glabris. *Podolia.*
- pectinatus* Cand. 44. S. caule ramoso, ramis pedunculis anthodiisque glanduloso-hispidis, foliis basi lata auriculatis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, laciniis linearibus cuspidatis integerrimis, pedunculis subpaniculatis divaricatis. *Gallia provinc.*
- scorzoneræformis* Lag. 45. S. foliis decursive pinnatis, foliolis linearibus, pedunculis squamosis 1floris, squamis anthodii margine scariosis. *Hispan. austr.*
- italus* \* 46. S. foliis decursive pinnatis glabris, laciniis rhombeis denticulatis deorsum versis, petiolis basi auriculatis, pedunculis subcorymbosis anthodiisque glanduloso-hispidiusculis. *Ad Paufilipum Neapol. et in Sicilia.*
- angustifolius* Desf. 47. S. subcaulis, foliis pinnatis glaberrimis glaucis subcarnosis, foliolis linearibus dentatis, pedunculis squamatis, anthodio glabro. *Numidia.*
- tenerrimus* 48. S. caule ramoso foliisque 2pinnatifidis glabris, laciniis angulatis obtusis petiolisque basi dilatatis auriculatis, anthodiis tomentosis demum turgidis. *Gallia austr.* (Cultu tomentum anthodii et dentes foliorum fere amittit.)

## 2881. BORKHAUSIA Böhm. (Barckhausia Mönch.)

\* *Foliis indivisis.*

- muricata* \* 1. B. caule ramoso superne setoso, foliis pilosis, radicalibus obovatis petiolatis dentatis, caulinis sagittatis subintegerrimis, floribus corymbosis, anthodiis muricatis hispidis. *Helvetia. Lachenal. Cyprus. Sibth. Afric. bor. Cella.* (Crepis muricata Sm., Crepis n. 32. Hall. stirp., Cr. nudiflora Viv.)
- versicolor* \* 2. B. caule erecto foliisque lanceolatis elongatis acutis repandis glabris, radicalibus longe petiolatis, caulinis sessilibus, involucri foliolis albo-marginatis. *Davuria.* (Lagoferis versicolor Fisch.)
- bellidifolia* Cand. 3. B. glaberrima, caule ascendente paucifloro, foliis radicalibus spathulato-oblongis subintegerrimis, caulinis sagittato-oblongis, involucri anthodii subfarinoso. *Corfica.* (Crepis bellidifolia Loif.)
- † *Suffreniana* Cand. 4. B. caule erecto basi piloso, foliis radicalibus oblongis sinuatis, caulinis paucis sessilibus linearibus, involucri farinoso. *Gallia provinc.* (Crepis bellidifolia var. Loif.)
- spathulata* \* 5. B. caule erecto glabro superne nudiusculo, foliis radicalibus spathulato-oblongis deorsum dentatis, caulinis lineari-lanceolatis acutis, ramis