

sit in eadem olla, in qua anno proxime elapso Daleae species sata fuerit, de patria dubius haereo.

310. *GLYCINE lancifolia*: caule volubili scandente: foliis ternatis: foliolis angustolanceolatis glabris, lateralibus obliquis: pedunculis axillaribus solitariis racemoso-quadrifloris.

Habitat in Canariis?

In H. R. M. floret Vere. 5.

CLASSIS XVII. SYNGENESIA.

ORD. I. POLYG. AEQUALIS.

* *Cichoraceae. Fuss.*

311. *PIGIDIUM pinnatifidum*: foliis amplexicaulibus oblongis pinnatifidis albo punctatis: pedunculis squamosis incrassatis: anthodii squarrosi.

Sonchus hispanicus. Jacq. Hor. Schoem. 2. pag. 9. tab. 143.

Venit solo arenoso inter sata circa Malacam et in Valentiae Regno.

Floret Vere. 6.

312. *SONCHUS simplicissimus*: pedunculis axillaribus squamosis paucifloris folio brevioribus: foliis oblongis dentato-spinosis: caule simplicissimo.

H. prope *Quintanar de la Orden, Aranjuez* oppida, alibiue locis argillosis.

Floret Julio. 11.

313. *SONCHUS scorzoneraeformis*: pedunculis squamosis unifloris: squamis anthodii margine membranaceis: foliis pinnatis, pinnis linearibus decurrentibus.

Venit in collibus aridis cretaeolis circa *Heliocratam, Murciam urbem* et alibi in *Murciae* et *Valentiae* Regnis. — Floret Vere. 11.

314. *PRENANTHES runcinata*: foliis radicalibus runcinatis spinuloso-cillatis: ramis divaricatis bifidis: floribus geminis solitariisve suboppositis pedicello squamoso longioribus. — *Sonchus reflexus. El. p. 15.*

Habit. ad saxorum calcareorum rimas in *Monte Sancti Michaelis* juxta *Orcelim, Alonam, Cuevas Overa* oppidum, alibiue in *Hisp. meridionali*. Floret primo Vere. 11.

315. *THRINCIA laevis*: radice fasciculata: foliis, scapis, pedunculis, anthodiiisque laevibus glaberrimis.

Habit. in Hispania.

316. *THRINCIA nudicalyx*: calycibus glabris laevibus subdecaphyllis: foliis lanceolato-oblongis sinuato-dentatis hirtis, pilis furcatis.

Radix simplex: folia obtusa, nonnunquam fere runcinata, subtus praesertim pilis furcatis hirtula.

Venit locis lapidosis, saxosisque circa *Orcelim*.

Floret Januarii et Februarii mensibus. 6?

SOLDEVILLA. Lag.

Char. gen. different.

Anthod. monophyllum, fructiferum basi ventricosum, laciniis tunc in conum convergentibus. Recept. paleaceum, paleis multifido-setaceis. Pappus nullus.

317. *SOLDEVILLA setosa. Lag. Varied. de*

Cien. an. 2. n. 19. Pers. Encybr. bot. 2. p. 348 ubi *calyx* communis perperam dicitur imbricatus. — *Hispidella hispanica. Barnades secundum. Cav. Herb. — Lam. Encycl. 3. p. 134.*
Hab. in locis arenosis aridis in utraque *Castella*. 6.

** *Cynarocephalae Juss.*

318. *CARTHAMUS hircinus*: caule erecto hirsuto subbifloro: foliis amplexicaulibus pubescentibus ovato-lanceolatis sinuatis spinosodentatis pungentibus.

Carth. arborescens Linn?

Venit ad montium radices circa *Malacam, Orcelim, Murciam urbem*, alibiue in *Murciae, Valentiae* et *Granatae* Regnis. — Odorem hircinum spirat.

Floret ultimo Aprilis et Majo. 5.

Vulgo *Cardo cabreo* *Orcelitanis* audit.

319. *CIRSIUM cernuum*: foliis subamplexicaulibus lanceolatis sinuato-pinnatifidis spinosis: subtus arachnoideis: calycibus arachnoideo-tomentosis cernuis.

Cirsium cernuum. Elench. H. R. M. ann. 1805.

Habitat in Imperio Mexicano. 11.

320. *CIRSIUM borridum*: arachnoideum: caule erecto subtrifloro: foliis semiamplexicaulibus spinosis bifariam pinnatifidis, laciniis profundissimis lanceolato-subulatis, integris: calycibus longe valideque spinosis. *Lag. Varied. ann. 2. n. 22 pag. 214.*

Legi in *Granatensis* Regno juxta viam, quae ab *Alhama* ad *Velex-Malaga* ducit, prope la *Venta alta*. — Floret Autumnno. 11. — *Corolla* alba.

321. *STHAELINA pinnata*: tomentosa: foliis pinnatis, pinnulis linearibus decurrentibus margine revolutis: pedunculis unifloris.

Habitat in *Extremadura, Mancha* et *Granatensis* Regno, alibiue in *Hispania meridionali*.

Floret Junii, Julii et Augusti mensibus. 11.

*** *Discoideae. Linn.*

G. N. PODANTHUS.

Ord. nat. Corymbiferae Fuss.

Char. gen.

Anthod. subimbricatum, parvum, multiflorum. Flosculi pedicellati, 5-dentati, aequales. Recept. paleaceum. Pappus coronula dentata.

322. *POD. ovatifolius. Frutex* ramis subangulatis, trichotomis, junioribus pubescentibus. *Folia* opposita, breviter petiolata, ovata, acutiuscula, scaberrima, subtus subpubescentia. *Pedunculi* terminales, terni, uniflori, subpollicares, dense villosi, in fructu elongati sesqui-bipollicares.

Hab. circa *Conception urbem*, et prope *Cbillan* oppidum Regni *Chilensis*, ubi vernacule *Palo negro* nuncupatur, uti ex schedula *cel. Ludovici Neé* constat.

G. N. CALYDERMOS.

Ord. nat. Fus. Corymbiferae.

Char. gen. different.

Anthod. oblongum, imbricatum, scariosum. Corolla flosculosa, flosculis 5-dentatis.