

М. Э. Кирпичников

M. Kirpicznikov

СИСТЕМА РОДА *SONCHUS* L.,
ПРИНЯТАЯ ВО «ФЛОРЕ
СССР»¹

SYSTEMA GENERIS *SON-*
CHUS L., IN «FLORA URSS»
A NOBIS ACCEPTUM

Sect. *Sonchus*. — *Sonchus* sect. II. *Sonchi genuini* W. Koch, 1837, Syn. Fl. Germ. : 433. — *Sonchus* sect. *Eusonchus* DC. 1838, Prodr. 7, 1 : 184. — Calathidia multiflora. Achenia erostris, apice plus minusve truncata. Plantae praecipue polymorphae, foliis alternis et saepe in parte caulis basali congestis, plerumque distincte divisis, margine plus minusve aculeato-dentatis.

Т у р u s: lectotypus generis.

Cf. quoque descriptiones specierum generis *Sonchus* in opusculo L. Boulos (1960), ubi subgenus *Sonchus* constituitur; descriptiones pollinum in opusculo S. Saad (1961).

Ser. 1. **Maritimi** Kirp. [1964, Фл. СССР 29 : 245, descr. ross.] ser. nov. — Achenia straminea vel fusca, plus minusve distincte tetragona, vix transverse rugosa.

Т у р u s: *S. maritimus* L.

Plantae in maritimis salsis necnon in arenosis siccis prope aquam (flumina, canales irrigatorios etc.) crescentes.

Ad seriem eandem species *S. maritimo* simillima — *S. transcaspicus* Nevski pertinet.

Ser. 2. **Palustres** Schchian [1949, Зам. по сист. и геогр. раст. Инст. бот. АН ГрузССР 15 : 63, р. р.; Kirp. 1964, Фл. СССР 29 : 246; in casu utroque rossice] ser. nov. — Achenia pallide lutea vel fusca, plus minusve distincte tetragona, vix transverse rugosa.

Т у р u s: *S. paluster* L.

Plantae in paludosis vel humidis crescentes.

Huc species nondum clara *S. sosnowskyi* Schchian pertinet.

Ser. 3. **Arvenses** Schchian [1949, Зам. по сист. и геогр. раст. Инст. бот. АН ГрузССР 15 : 63; Kirp. 1964, Фл. СССР 29 : 249;

¹ Описания приводимых ниже таксонов на русском языке даны во «Флоре СССР» (1964, 29 : 245—254).