

granulatis, pappo inter omnes longissimo, persistente, foliorum lyratorum lobis rotundatis, dentatis, corymbi pedicellis squamis patentibus munitis, capitulis speciosissimis, involueri squamis squarrosis. Porro : *Sonchus lavigatus* Willd., distinctus, achæniis ovato-oblongis, glabris, pappo caduco, capitulis mediocribus, pedicellis esquamosis, foliis rameis lato-cordatis, si enim specimina mea, nomine S. lavigati in horto Vindob., S. Jacquinii Spr., in horto Stuttg., et S. ustulati in horto Milford. culta cum planta Willdenowii identica.

β. Folia caulinæ sessilia. = 11. *Sonchus pinnatus* Hort. Kew. β. Palmensis Webb! icon. tab. 150. Achænia granulata, utrinque lineis 2 impressis notata; pappo subpersistente pluriseriali; foliis sessilibus pectinato-pinnatipartitis, pinnis acutis denticulatis. Inflorescentia sæpius umbellata, qua nota Sonchis umbellifloris + — accedit.

OBS. I. *Sonchus ustulatus* Lowe! DC., Pr., 7, p. 189, valde affinis. Formæ insuper multæ maderenses hic spectant, sub quibus verosimiliter species una alterave latet nova.

OBS. 2. *Sonchus quercifolius* Desf. ! — DC., Pr., 7, p. 188, etiam hic spectat. S. fruticosus, glaber, caule inferne foliato, dichotome ramoso, ramis monocephalis foliorum, sessilium, basi utrinque parve auriculariorum, pinnis lanceolatis, acutis, dentatis, pedicellis subbracteatis, involueri imbricati squamis ovato lanceolatis, latis. Achænia ex DC. glabra. Affinis Soncho patylepide Webb! sed diversus foliorum lobis dentatis et involueri squamis angustioribus. (V. sp. in herb. Mus. Paris.)

Div. II. *Microcephali* C. H. Schultz Bip. MS. Capitula 5-20 flora. = *Atalanthus* Don. DC., l. c. ex parte, excluso nempe *Soncho spinoso*, Launæ proximo, Huc :

12. *Sonchus leptcephalus* Gass. Capitulis 5-8-floris, pappo caducissimo.

13. *Sonchus arboreus* DC. Capitulis 15-20-floris, pappo persistente.

Subgen. IV. Species herbacea. = *Lactucosonchus* C. H. Schultz Bip. Capitula 12-14-flora. Achænia obovata, trisulcata, brunnea, pappus caducus, radis subæqualibus, magis conferte denticulatis. Huc : 14. *Sonchus Webbii* Schultz Bip.

Subgen. V. Species herbaceæ, annuæ, macrocephalæ, achæniis muricato-granulatis, exalatis, pappo persistente. = *Eusonchus* C. H. Schultz Bip.

α caulis a costâ folii decurrente valde alatus, flores speciosi obscurè aurei, achænia valde rugosa, granulata.

= 15. *Sonchus Bourgeauii* C. H. Schultz Bip.

β caulis exalatus, flores parvi, sulphurei, achænia granulata. = 16. *Sonchus levigatus* Camér.

OBS. Huc etiam *Sonchus tenerrimus* Linn., floribus majoribus, achæniis elongatis inter alia diversus.

Subgen. VI. Species herbaceæ, annuæ, macrocephalæ, pappo persistente, achæniis plano-compressis, glabris, utrinque tricarinatis, alat.s. = *Pterosonchus* C. H. Schultz Bip. Huc : 17. *Sonchus asper* Fuchs.

OBS. Prolem hybridam Sonchum lœvem inter et asperum. = *Sonchus lœvi-asper* Schultz Bip., foliis spinuloso-sagittatis, achæniis tristriatis, asperulis, e. g. e glareosis insulae Palmae habeo.

SUBGEN. I. *PRENOCEPHALUM*. C. H. Schultz Bip. ($\pi\sigma\eta\eta\varsigma$, cernuus). Ob capitula post achæniorum maturitatem nutantia.

Affine Heterachæna Fresen. ! Mus. Senkenberg., 3, p. 74 (Heterachæna massanensis Fresen. ! *Sonchus massanensis* C. H. Schultz Bip. in litt. ad cl. Fenzl.!).

Capitula 21-flora, post achæniorum maturitatem nutantia. Achænia columnari-tetragona, compressiuscula, oblongo-linearia, nigrescentia, transverse ruguloso-muricata, utrinque 2-sulca, erostria, collo glabro, flavente paulo angustiore, a pappo persistente pluriseriali, mollissimo, subsimplici, inæquali, digitis adhærente separata; achænia centralia pauca pallida, suberosa, vix muriculata, pl. effœta. Invo-