

Folia non subtilis glauca; Pedunculi non tomentosi sed tantum subaristosi. Involucra et Involucella nulla, folia vero sparsa in pedunculis ramosis non umbellatis, lanceolata. W.

* 5. SONCHUS acidus.

S. pedunculis ramosis nudis, calycinis squamis patulis, foliis pinnatifidis, lacinias oblongo-lanceolatis acuminateis integerrimis, caule fruticolo. W.

Sonchus acidus. Schousboe in litt.

Sanere Gänselfiel. W.

Habitat in imperio Maroccane. h (v. f.)

Folia semipedalia petiolata glabra pinnatifida, lacinias oblongo lanceolatis acuminatis integerrimis. Pedunculi valde ramosi subdichotomi subumbellati nudi. Flores magnitudine S. arvensis. W.

* 6. SONCHUS pinnatus. †

S. pedunculis nudis, calycibus laevibus foliis pinnatis, pinnis linear-lanceolatis subdentatis. Ait. Kew. 3. p. 116.

Gehederte Gänselfiel. W.

Habitat in Madera. h

* 7. SONCHUS radicatus.

S. pedunculis nudis calycibusque glabris, caule subnudo, foliis radicalibus lytatis utrinque laevibus, lobis triangulare-ovatis. Ait. Kew. 3. p. 116.

Bewurzelte Gänselfiel. W.

Habitat in Madera. h

* 8. SONCHUS taraxacifolius. W.

S. pedunculis squamosis, floribus paniculatis, foliis runicatis calloso-dentatis basi attenuatis. W.

Löwenrahnhartige Gänselfiel. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis crassitie pennae auferinae spongiosus. Folia confertissima Taraxici basi attenuata glabra dentata, dentibus apice albis. Folia superiore lanceolata fere indivisa subdentata; summa linearia integerrima. Pedunculus communis panicis foliis instructus, semipedalis et ultra, apice in paniculam divisus. Pedunculi pro-

prii brevissimi squamosi ad apicem ramorum paniculae conferti. Calyx Lactucar sativae. Color floris mihi ignotus. Pappus pilosus sessilis. W.

9. SONCHUS palustris.

- S. pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. Sp. pl. 1116. Neck. gallob. p. 326. Pall. it. 1. p. 59. Hoffm. germ. 275. Roth. germ. I. 342. II. 272.
 S. pedunculis calycibusque hispidis, floribus distanti-corymbosis. Hort. upf. 244.
 S. caule erecto, foliis pinnato-hastatis spiceaque hastatis, floribus congestis villosis. Hort. cliff. 385. Roy. lugdb. 129. Dalib. paris. 244.
 S. asper arbotelcens. Bauh. pin. 124.
 S. laevior austriacus s. altissimus. Clus. hist. 2. p. 147. Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 23.
 Sumpf-Gänsefiedel. W.

Habitat in Belgii, Angliae, Germaniae, Galliae, Hungariae pratis paludosis. 24 (v. v.)

Facies a S. arvensi diversissima; Structura tamen ita eadem, ac si S. palustris ex S. arvensi olim ortus fuisset.

*10. SONCHUS arvensis.

- S. pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. Sp. pl. 1116. Neck. gallob. p. 325. Pollich. pal. n. 726. Flor. dan. 1. 606. Hoffm. germ. 275. Roth. germ. I. 342. II. 273.
 S. foliis amplexicaulinibus, semi-pinnatis, ferratis, calycibus hispidis. Hall. helv. n. 23.
 S. pedunculis calycibusque hispidis, floribus congestis. Fl. Juss. 642; 687. Dalib. paris. 243.
 S. folia lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. Hort. cliff. 384.
 Hieracium arvense. Scop. carn. ed. 2. n. 974.
 Hieracium major, folio sonchi, f. Hieracium sonchites. Bauh. pin. 126.
 Hieracium major. Fuehf. hist. 319.
 Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 24.
 Acker-Gänsefiedel. W.
 Habitat in Europeae agris argillosum. 24 (v. v.)