

- lobos subintegerrimis aut spinuloso-dentatis. Proximus *S. maritimo*. (v. s. comm. à cl. Turczaninow.)
19. *S. WIGHTIANUS*, radice sublignosâ, caulibus adscendenti-erectis subangulatis glabris, foliis auriculis rotundis amplexicaulibus oblongo-lanceolatis inæqualiter et acutè dentatis glabris glaucescentibus, summis ferè linearibus, pedicellis laxè subcorymbosis involucrisque glanduloso-pilosis, achæniis oblongis striatis tenuissimè transversè subrugosis. ♀ in Peninsula Indiæ orientalis legit cl. Wight! Accedit ad *S. maritimum* sed folia latiora breviora. Invol. squamæ lineares demùm reflexæ. (v. s.)
20. *S. DENTATUS* (Ledeb. fl. alt. 4. p. 141, icon. ill. 1. t. 87), radice repente, caule erecto foliisque glaucis glabris, infer. oblongis dentatis, super. lanceolato-linearibus integerrimis, capitulis racemoso-corymbosis, involucri hispidi cylindrici squamis apice ciliato-barbatis. ♀ in Sibiria Altaicæ subhumidis salsis deserti editi ad fl. Tschuya expansi. Flor. lutei. Pappus albidus. Achænia rufescentia glabra longitudinaliter striata. (v. s. comm. à cl. Bunge.)
21. *S. MARITIMUS* (Linn. sp. 1116), glaber, radice repente, caule erecto aut subdecombente subsimplici, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argutè serratis glaucescentibus, pedunculis paucis 1-cephalis sæpè subtomentosus, achæniarum costis lævibus. ♀ in maritimis Mediterraneis Europæ australis et Mauritanicæ, secus Oceanum à Lusitaniâ ad Rupellam, etiam secus stagnum salsum Courteison in Delphinatu (Vill.) All. fl. pedem. n. 318. t. 16. Cav. ic. t. t. 51. Sonch. nitidus Vill. dauph. 3. p. 160. Sonch. angustifolius Neck. gallop. 326. — Ab hoc vix differt Sonch. aquatilis Pourr. act. tol. 3. p. 330. nisi foliis subsinuatis, nec verisim. Sonch. littoralis Reich. fl. exc. 1. p. 274, nec Sonch. crispus Poir. suppl. 3. p. 289, potiùs fortè ex agro Mogadoriensi quàm ex ins. Canariis ortus. (v. v. et s.)
22. *S. CRASSIFOLIUS* (Pourr. in Willd. sp. 3. p. 1509), caule erecto simplici, foliis crassiusculis glaucescentibus amplexicaulibus lanceolatis inæqualiter acuminato-dentatis basi rotundatis, pedunculis subumbellatis squamosis. ♀ in Hispaniâ Spreng. syst. 3. p. 648 excl. Thunb. syn. Medius dicitur inter maritimum et arvensem.
23. *S. ARVENSI* (Linn. sp. 1116), radice repente, caule erecto glabro, foliis runcinato-pinnatifidis spinuloso-dentatis cordato-amplexicaulibus, auriculis brevibus obtusis, paniculâ umbellato-corymbosâ, pedicellis involucrisque hispidis, achæniis subtetragonis secus costas transversè rugulosis. ♀ in arvis et agris argillosis Europæ et (verisim. introd.) in Amer. bor. Fl. dan. t. 606. Engl. bot. t. 674. Lasch in linneâ 1829. p. 408. Lepicaune spinulosa Lapeyr. abr. p. 480 et idèd Hieracium spinulosum Spreng. syst. 3. p. 645. — Lob. ic. t. 437. f. 1. (v. v. et s.)
24. *S. PALUSTRIS* (Linn. sp. 1116), radice simplici subtuberosâ, caule elato basi glabro apice cum pedunculis et invol. hispido, foliis elongato-lanceolatis, infer. runcinatis, sup. indivisis, omnibus spinuloso-ciliatis basi sagittatis, auriculis longis acutis, corymbo umbellato polycephalo, achæniis secus costas minutissimè rugulosis. ♀ in pratis paludosis et ad margines fossarum Europæ, usque ad Armeniam (Auch.). Fl. dan. t. 1109. Engl. bot. t. 935. Lasch in linneâ 1829. p. 408. Caulis 4-5-pedalis. (v. v. et s.)

§. 3 Fruticosi.

25. *S. SQUARROSUS* (DC. cat. h. monsp. 1813. p. 147), caule fruticoso sæpiùs ramoso, foliis glabris semiamplexicaulibus sinuato-repandis, inferioribus pinnatifidis sublyratis lobis obtusis, super. subintegris, paniculâ corymbosâ laxâ, pedicellis glabris, invol. squamis apice patulis obtusis. ♂ in rupibus altis Maderæ (Masson! Lowe!). Sonchus fruticosus Linn. f. suppl. 346. L'Hér. stirp. nov. 171. t. 81. Willd. sp. 3. p. 1510 non Jacq. Achænia minuta, transversè striato-rugulosa. Caulis crassus spongiosus. Variat formâ foliorum, sed involucri squarrosi speciei faciliè distincta. (v. v. c. et s. sp.)