

21. — *Sonchus abbreviatus* Link.  
var. *gibbosus* Svent., var. nova.

Habitu robustiori, valde ramificato, caulis usque ad 2 metralis, valde lignosis et tortili ramificatis et sine vestigii foliorum vetustorum vestimentum; foliis valde numerosis ad apicem caulorum dense congregatis, ambitu linear-lanceolatis, sub-opposite vel alternatisve trianguli-lobatis etiam ad dimidiam partem superiorem foliorum integris aliquanter dilatatis sagittæformibus; inflorescentia brevicaulis, corymboso-umbelliformia, generaliter 6-capitulari, pedunculis albido-pannoso-floccosis; calathiis mediochres (circiter 2 cm. diam.), involucro ante floratione valde ~~depresso~~, 5-seriali; bracteis involucralibus inferioris latè rotundatis et valde incrassato-gibbosis, margine superiori serrulato-hyalino, intimis papyraceis translucentibus; achænio linear-elliptico, 3-4 mm. long., compresso, longitudinaliter sulcato et transversè ruguloso, castanei colore. — Floret et fructificat hiberne — veræ.

Habitat inter saxas humoso-umbrosas regionibus sylvosis.

Canaria magna: covallibus ad septentrionem, ubi mense februarii 1966 primum lectus. Sat rarus.

22. — *× Sonchus jaquini ocephalus* Svent.,  
hybr. nat. novus.

(*Sonchus Jacquinii* DC. × *S. leptocephalus* Cass.)

Frutex bimetalis vel altior, multicaulis, caulis erecto-arcuatis in parte inferiori, plus minusve 5 cm. diam., lævibus; crescentiæ annotiniis sat densè foliatis foliis 15-30 cm. long., ambitu ovalate-lanceolato, saturatè viridis, nervis et rhachide lucidè albidis, glaberrimis, profundè pinnatisectis, sectionibus suboppositis, læviter falciformibus, serrulatisves margine inferiori breviter et sat distanter lobulati; inflorescentia irregulariter subumbellate-corymbosa paniculatisve, glabra, capitulis plus minusve 2 cm. diam., involucro 4-5-seriali bracteis exterioribus breviter triangularibus, intimis angustè linearibus; achænia brunnea, compressè fusiformia et valde recurvata, uterque extremi truncata. Floret et fructificat fere toto anni.

Nivaria: supra oppidum Icod de los Vinos, in rupibus humidiusculi-humosis, ubi inter parentes radicans, die 17 Febr. 1966 primum lectus.