

todon terglovensis Hacquet pl. alp. carn. p. 11 n. 7 tab. 2 fig. 5 (an. 1782). — Hieracium hyoseridifolium Vill. mém. sur la découverte d'une nouv. espèce d'Hieracium c. icone! (an. 1807). — Pers. syn. II. p. 370 (an. 1807) qui Villarsii comment. ined. citaverat. — Crepis hyoseridifolia Tausch. B. Z. 1828, I. Ergänzungsbl. p. 79.

C. Dianthoseris \* in Schimp. it. abyss. n. 755 et Flora B. Z. 1842 p. 439.—A. Rich.! Abyss. p. 465.—Schweinf. Beitr. p. 145. Pappus crassiusculus, inferne flavescens, dorso glaber. Rhizoma fusiforme, simplex. Capitulum speciosum, inter folia rosulata, spathulata sensim in involucri squamas transeuntia, sessile.

3) Omalocline Schimper! \* — Crepis nivalis \* olim. — In Abyssinia alpibus alt. 9500—13,800': Schimper!

D. Daucomalocline \* Achaenia pallida majora breve rostrata, obsoletius striata, Melanoberiniis affinia, pappus biserialis concolor radiis inferne dorso pubescentibus. Rhizoma fusiforme, caulis foliatus capitulo specioso coronatus. Involucrum atro-virens. Receptaculi alveoli villosi.

4) Omalocline montana \* — Crepis montana Rehb.! — Tausch! Bisch.! Beitr. p. 299. — Hieracium montanum Jacq. — Hypochoeris pontana Cod. Lin. n. 5910.

Soyeria Monn.! ess. p. 74 ex parte. — Sz Bip. emend. — Achaenia cylindracea, glabra, 20-costulata, infra pappum persistentem, 1-serialem, niveum, denticulatum in collum attracta pl. discolor. — Herbae radice succisâ fibris longis crassisque instructâ: Sectio V. Succisocrepis Sz Bip. in Bisch.! Beitr. ex parte.

A. Involucrum subimbricatum. Achaenii flavo-brunnei collum discolor. = Trachelioracium \*.

Soyeria hieracioides \*. — Crepis hieracioides W. K. Hung. I. p. 71 t. 70. — Crepis succisaefolia Tausch. —