

27. *Spitzelia cupuligera*. DR.

Annua, tota pilis glochidiato-bidentatis hispida; caule ramoso, erecto vel adscendente; foliis lanceolato-oblongis, inferioribus pinnatifido-sinuatis vel subintegris, basi attenuatis, cæteris semi-amplexicaulibus, inciso-dentatis integrisque; pedicellis bracteolatis, non aut vix incrassatis; involucri squamis exterioribus augustissimis, inermibus, demum reflexis, interioribus definite 13, maturo fructu stellatim patentibus, rigidis, linearibus, membranaceo-marginatis, dorso carinatis denseque aculeolatis; ligulis profunde quinque dentatis; achæniis disci deciduis transverse rugoso-scabris, in rostrum breve apice attenuatis, marginalibus tot quot involucri squamæ interiores earumque sulco longitudinali exceptis, persistentibus, teretibus, modice arcuatis, pappo cupulæformi membranaceo coronatis.

HAB. Dans presque toute l'Algérie, sur le littoral et dans l'intérieur, tant dans les plaines basses que sur les montagnes, jusqu'à plus de 1,000 mètres de hauteur.

Cette plante devient le type le mieux caractérisé du genre *Spitzelia* C. H. Schultz, lequel diffère du *Picris* de la même manière que le *Thrinicia* du *Leontodon*. L'adoption du *Thrinicia* entraîne nécessairement celle du *Spitzelia*.

28. *Peplis hispidula*. DR.

Erecta, simplex vel parum ramosa, haud radicans; foliis sessilibus, inferioribus oppositis, oblongo-linearibus, superioribus approximate alternis, ellipticis oblongisque; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus, brevissime bracteatis; calycis cylindracei dentibus interioribus deltoideis, exterioribus dimidio brevioribus, conicis; capsulâ inclusâ, cylindraceâ, stylo brevi superatâ, stigmatate crasse hemisphærico, dense papilloso-hirto. — Herba annua, humilis, tenera, caule filiformi quadrangulo calycibusque hirtellis. Folia margine passimque dorso hirtella, facie glaberrima. Florum subsessilium bractææ setacæ, calycis partem quartam, passim vix octavam, longæ. Dentes calycini 10-12. Petala 6 vel pauciora, minima, subro-