

β glabrum; scâpis glabris. *T. halophilum* Trautv. mss.

Am Berge Kara beim See Marka-Kul im Saissan-Gebiet, am Sary-djas Gletscher im Thian-Schan bei 8500—9000 Fuss über dem Meere.

Von den jedenfalls sehr schwierig zu unterscheidenden Arten dieser Gattung, können wir *T. corniculatum* DC. und *T. caucasicum* DC. nicht unterscheiden und dürfte es richtiger sein, beide Arten zu vereinen.

650. *Taraxacum glaucanthum* DC.

DC. prodr. VII. 147. Ledb. fl. ross. II. 814. Kar. et Kir. en. pl. soong. p. 129. № 521. Bnge. reliq. Lehm. p. 381. № 812.

Am schwarzen Irtysh bei Tschinguildi im Saissan Gebiet.

651. *Taraxacum Steveni* DC.

DC. prodr. VII. 149. Ledb. fl. ross. II. 816. Boiss. et Buhse pl. transe. p. 141. Trautv. pl. Schrenk. pag. 387. № 709.

Am Sary-djas Gletscher im Thian-Schan bei 8500 — 9000 Fuss über dem Meer, ferner zwischen den Gebirgspässen Kok-djar und Tekes im Thian-Schan bei 9900 Fuss über dem Meere.

652. *Streptorhamphus hispidulus* Rgl.

Streptorhamphus Bnge. cfr. Bnge. reliq. Lehm. p. 381. № 814.

Str. crambifolius Bnge. (l. c.); glaberrimus, capitulis aliis breviter pedunculatis, aliis sessilibus. — Caulis superne corymboso-ramosus.

St. hispidulus; pedunculis involucrisque hispidulis, capitulis omnibus pedunculatis.

Caulis erectus, $1\frac{1}{2}$ — 2 pedalis, sulcatus, glaber, a basi corymboso-ramosus, foliosus. Folia radicalia desunt. Folia caulina inferiora e basi angustata cordato-semiamplexicauli ovato-oblonga, glauca, dentata; superiora (bracteae) decrescentia, caulina e basi auriculato-cordata anguste lanceolata, ramulorum e basi subcordata amplexicauli anguste lanceolata. Capitula oblonga, omnia pedunculo semipollicari usque bipollicari suffulta. Involucrum imbricatum; squamae acutae, dorso praecipue in nervo medio hispidulae: exteriores circiter 12, extimae elliptico-lanceolatae breviores, lanceolatae, interiores circiter 12, aequilongae, angustissime lanceolatae. Achaenia elliptico-oblonga, plano-compressa, margine alata, subito in rostrum tenue attenuata; rostrum achaenio brevius. Pappus duplex; exterior brevissimus, compositus e setis brevissimis pallide flavis; interior pilosus, candidus, compositus e pilis vix scabridis achaenio incluso rostro paullo longioribus

Tamgaly-Pass am Ili-Fluss in einer Höhe von 1000 bis 1200 Fuss über dem Meere.

Es liegen uns drei Exemplare vor, an allen sind aber die unteren Blätter theils defekt, theils fehlen sie ganz, es scheint jedoch, dass die untersten Blätter in einen Stiel verschmälert herablaufen. Steht dem *St. crambifolius* Bunge nahe, kann aber, nach dem Wenigen, was uns vorliegt, nicht mit dieser Art vereinigt werden.

653. *Crepis rigida* Waldst. et Kit.

W. et K. pl. rar. Hung. I. p. 18. tab. 19.

γ *soongorica* Kar. et Kir.

Kar. et Kir. enum. pl. Soong. p. 130. № 524. Ledb. fl. ross. II. 821. Trautv. pl. Schrenk. p. 387. № 710. № 3. 1867.