

Stachys germanica L. ssp. *cordigera* Briq., Les. lab. des Alp. marit., 232.

var. *canariensis* F. Q. et Sventenius, nova. — A varietate lusitanica differt foliis praecipue pagina inf. densissime lanatis, calycis dentibus rigidis, subpatentibus et corollae labio sup. dorso longe denseque barbato. — Hab. in clivis supra Benijo (Ins. Teneriffa), ad 450 m. alt., ubi leg. Svensson Sventenius.

Pulicaria canariensis C. Bolle var. *lanata*. F. Q. et Sventenius, var. nova. — A typo nisi foliis bracteisque involucrorum dense albo lanatis differt.

Hab. in rupestribus abruptis insulae Lanzarote (Canariae insulae), l. Risco Famara dicto, juxta Salta-si-puedes, a 2 usque ad 400 m. alt., ubi cl. E. R. S. Sventenius d. 18 maji 1948 legit.

Sventenia, gen. novus (Compositae-Liguliflorae-Cichorieae-Crepidinae). — Involucro bracteis 20-25, pluriserialibus, florandi tempore herbaceis, deinde accrescentibus basi caloso intumescentibus albicantibusque, parte superiori elongata, liguliformi, membranacea. Receptaculo nudo, alveolato, alveolis circacircum marginatis, margine membranaceo lacinulata. Achaeniis conformibus, tenuissime sulcatis, longe rostratis, appendicibus squamisque destitutis. Pappo sessili, duplo, e setis 6-10, rigidis, deciduis et pilis mollibus, tenuissimis, persistentibus, omnibus denticulatis, formato. Herbae perennes, spectabiles, caulis scapiformibus foliisque rosulatis. Typus generis species seq. :

Sventenia bupleuroides sp. nova. — Planta a basi ramosa, late laxeque caespitosa, caulis 25-30 cm alt., inferiori parte 5-7 mm crassis, defoliatis et cum foliorum vetustorum basibus arcte cinctis ideoque iūrregulariter corticatis, apice foliorum rosulas edentibus; folia glabra, glauco pruinosa, coriacea, sublanceolata, obtusiuscula, integerrima; caulis supra rosulam