

Stachys germanica L. ssp. **cordigera** Briq., Les lab. des Alp. marit., 232.


var. canariensis F. Q. et Sventenius, nova. — A varietate lusitanica differt foliis praecipue pagina inf. densissime lanatis, calycis dentibus rigidis, subpatentibus et corollae labio sup. dorso longe denseque barbato. — Hab. in clivis supra Benijo (Ins. Teneriffa), ad 450 m. alt., ubi leg. Svensson Sventenius.

Pulicaria canariensis C. Bolle var. **lanata**. F. Q. et Sventenius, var. nova. — A typo nisi foliis bracteisque involucrorum dense albo lanatis differt.

Hab. in rupestribus abruptis insulae Lanzarote (Canariae insulae), l. Risco Famara dicto, juxta Salta-si-puedes, a 2 usque ad 400 m. alt., ubi cl. E. R. S. Sventenius d. 18 maji 1948 legit.

Sventenia, gen. novus (Compositae-Liguliflorae-Cichorieae-Crepidinae). — Involucro bracteis 20-25, pluriserialibus, florendi tempore herbaceis, deinde accrescentibus basi calloso intumescens albicantibusque, parte superiori elongata, liguliformi, membranacea. Receptaculo nudo, alveolato, alveolis circacircum marginatis, margine membranaceo lacunculata. Achaeniis conformibus, tenuissime sulcatis, longe rostratis, appendicibus squamisque destitutis. Pappo sessili, duplo, e setis 6-10, rigidis, deciduis et pilis mollibus, tenuissimis, persistentibus, omnibus denticulatis, formato. Herbae perennes, spectabiles, caulibus scapiformibus foliisque rosulatis. Typus generis species seq. :

Sventenia bupleuroides sp. nova. — Planta a basi ramosa, late laxaque caespitosa, caulibus 25-30 cm alt., inferiori parte 5-7 mm crassis, defoliatis et cum foliorum vetustorum basibus arcte cinctis ideoque iurregulariter corticatis, apice foliorum rosulas edentibus; folia glabra, glauco pruinosa, coriacea, sublanceolata, obtusiuscula, integerrima; caulis supra rosulam



SVENTENIA BUPLEUROIDES F. Q.

A, plantae habitus, 1 : 2 ; B, capitulum, 2 : 1 ; C, capitulum defloratum cum bracteis a basi incrassatis, 2 : 1 ; D, bracteae capituli sectio transversalis, 20 : 1 ; E, receptaculum, cum alveolis, 6 : 1 ; F, alveolorum membrana, 20 : 1 ; G, achaeium, 8 : 1 ; H, pappus, 15 : 1.

aphyllus, crassiusculus, ca. 5 mm diam., plus minusve piloso glandulosus, pilis rufescentibus, 0'5-1 mm long., a medio ramoso subcorymbosus; capitula 10-25, involucris ca. 1 cm diam., bracteis exterioribus apice denticulatis, interioribus elongatis, acutis, integris, omnibus heterotrichis, pilis albidis, tenuissimis, crispatulisque mixtis cum alteris rigidis glandulosisque; ligulae luteae, involucro parum superantes; achaenia castanea, 5-6 mm long.

Hab. in Canariae Insulae, in fissuris rupium abruptarum locisque subumbrosis l. Risco Goyedra dicto (Canaria Major), ubi d. 21 maji (fl.) et 25 sept. (fr.) cl. E. R. S. Sventenius, cui dicatus genus, legit.