

*Syncalathium* Lipsch. genus novum (subtribus *Syncalathinae* tribus *Cichorieae*, subfam. *Liguliflorae*). (Conf. tab.)

Perenne vel biennе (?), monocarpicum (?), rosulans, rhizocephalum. Radix tenuis vix ramosa in rhizoma debile tenue transita; rhizoma squamulis minutissimis obtectum. Folia rosulantia crassiuscula rugosa rubra (e nota collectoris), ovata usque rotundato-spathulata marginibus serrulato-dentata, dentibus inaequalibus apice vix cartilagineis; lamina petiolata, petiolo in vaginam membranaceam dilatato, utrinque plerumque in parte inferiore plus minusve pubescentia, pilis mollibus simplicibus, nervis subarcuatis in pagina inferiore vix prominentibus. Folia rosulantia procumbentia sensim in phyllaria involucri communis demutata. Involucrum commune 3—∞-seriatum; phyllaria exteriora herbacea magna folia rosulantia in mentem revocantia sed minora, sprathulata, apice obtusa basi in vaginam membranaceam dilatata, media minora, cochleariformia, interiora ad capitulis propriis approximata, angustiora linearia in parte superiore cuculliformia barbullata, barbula e pilis albis simplicibus. Receptaculum commune nudum epaleatum. Calathidium commune unicum e capitulis propriis (partialibus) vix pedunculatis plus minusve numerosis in receptaculo communi sessilibus sistens. Involucrum capituli proprii uniseriatum, phyllariis 3 liberis navicularibus subscariosis saepe roseis in parte superiore extus barbullatis, barbula e pilis simplicibus albis rigidis. Capitula propria (partialia) triflora, homogama, aequaliflora, floribus omnibus hermaphroditis, fertilibus, ligulatis, ligula ad apicem truncata, 5-dentata, 5-nervia, nervis simplicibus valde prominentibus, rosea (e nota collectoris) in sicco purpurea. Antherae in tubum stylum cingentem connatae apice truncatae appendiculatae, appendicibus brevioribus membranaceis acutiusculis, basi brevi membranaceo-attenuatae truncatae obsolete dentatae, filamentis liberis ad basin antherarum affixis. Styli rami tenues subteretes valde hirtelli et papilloso, papillis ad partem superiorem styli transientibus. Ovarium et achenium immaturum apice obtusum, calvum, planum. Pappi setae multi-seriatae numerosissimae tenues simplices crenulatae sordidae basi in annulum non coalitae. Herbae pygmae alpinae succo lacteo.

Ab affinibus generis *Sorosaris* Stebbins involucre communi herbaceo, florum numero in capitulis propriis (partialibus), floribus roseis in sicco purpureis (nec luteis vel albidis), involucre proprio uniseriali (nec 2—3 seriali) e 3 phyllariis optime differt.

Т у п у с г е н е р и с : *Syncalathium Sukaczewii* Lipsch.

*Syncalathium* Lipsch. genus novum (подтриба *Syncalathinae* трибы *Cichorieae*, подсем. *Liguliflorae*). (рис. 5)

Многолетнее или двулетнее (?), монокарпичное (?) розеточное ризоцефальное растение. Корень тонкий, слабо ветвящийся, переходящий в короткое тонкое корневище, одетое малочисленными или единичными чешуями. Листья прикорневые в розетке (в числе до 14), толстоватые, в сухом виде морщинистые, окрашенные (по этикетке коллектора), яйцевидные до округло-лопаччатых, по краю пильчато-зубчатые, с неравными зубчиками, на верхушке слегка хрящеватыми. Пластинка переходит в черешок, у основания расширенный в пленчатое влагалище; с обеих сторон она более или менее негусто опушена мягкими простыми волосками, особенно развитыми в нижней части ее, в месте перехода в черешок; жилки слегка дуговидные, слабо выдающиеся на нижней поверхности