

Биол. журн. Армении, № 3.(43).1990

УДК 582.998.4

**ТАКHTAJANIANTHA NAZAROVA И LACTUCELLA NAZAROVA—  
ДВА НОВЫХ РОДА ТРИБЫ LACTUCEAE (СЕМ. ASTERACEAE)**

Э. А. НАЗАРОВА

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Описаны два новых монотипных рода трибы *Lactuceae*, семейства *Asteraceae*, ранее приводимые как виды родов *Scorzonera* и *Lactuca*. Приводятся аргументы (данные сравнительно-морфологического, кариологического и биохимического анализов) в пользу выделения их в самостоятельные монотипные роды. Даётся латинский диагноз.

Նկարագրված է *Asteraceae* ընտանիքի *Lactuceae* տրիբայի 2 նոր ցեղեր, որոնք նախկինում նշվել են որպես *Scorzonera* և *Lactuca* ցեղերում համապատասխան տեսակներ: Բերվում են փաստեր (համեմատական-մորֆոլոգիական, կարիոլոգիական և կենսաքիմիական անալիզ տվյալներ)՝ ի օգուտ նրանց անշատման որպես ինքնուրուզն մոնոտիպ ցեղեր: Տրվում է լատիներեն դիագնոզ:

Two new monotype genera of the tribe *Lactuceae*, of the family *Asteraceae*, earlier stated as species of the genera *Scorzonera* and *Lactuca*, have been described. Arguments have been cited (data of comparative-morphological, caryological and biochemical analysis) on behalf of turning them into independent monotype genera. Latin diagnosis has been given.

Триба *Lactuceae*—новые роды—кариотип.

**TAKHTAJANIANTHA Nazarova gen. nov. (*Asteraceae*, tribus *Lactuceae*, subtribus *Scorzonerinae*).**

Planta perennis, (5) 10—30(40) cm altus; profunde tuberosa, collum copiose tunicato-fibrosum. Caulis tenuis, diffusus, flexuoso-ramosus. Folia numerosa, 1—2 mm, rare 3—4 mm lata, plana, linearifiliformia, parce floccoso-tomentella vel glabrescentia, apice cincinnato-involuta. Involucrum floriferum 1.5—3 cm, fructiferum 2.5—4 cm longum, cylindricum, albo-floccoso-tomentellum vel glabrescens, phylla exteriora valde abbreviata, ovata vel ovato-lanceolata, interiora oblongo linearia, omnia obtusiuscula. Ligulae flavae. Achaenia 8—12 mm longa, glabra, cylindrica, sulcato-costata. Pappus albidus, 22—25 mm longus, divaricatus.

Affinitas. Ab *Scorzonera* L. tuberibus valde profunde in solum immersis, caulinis diffusis, follis apice cincinnato-involutis bene differt.

Type s. *T. pusilla* (Pall.) Nazarova.

Genus monotypicum.

Ареа geographicā: Jordania, Anatolia orientalis, Transcaucasia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turcomania, Asia centralis, Sibiria austro-occidentalis.