

Подсем. *Cichorioideae* (Juss.) Chevall.

Триба *Cichorieae* Lam. et DC.

Подтриба 1. *Cichoriinae* Hoffm.

1. *Cichorium* L. (3).

Подтриба 2. *Hyoseridinae* Less.

2. *Koelipinia* Pall. (1).

Подтриба 3. *Hypochaeridinae* Less.

3. *Trommsdorffia* Bernh. (2). — 4. *Picris* L. (3).

Подтриба 4. *Crepidinae* Dumort. (incl. *Hieraciinae* Dumort., *Syncalathinae* Lipsch., *Ixeridinae* Sennik.).

5. *Hieracium* L. — 6. *Pilosella* Hill. — 7. *Hololeion* Kitam. (1). — 8. *Dubyaea* DC. (2). — 9. *Pterotheca* Cass. (1). — 10. *Crepis* L. (15). — 11. *Tibetoseris* Sennik. (7). — 12. *Askellia* W. Weber (9). — 13. *Crepidifolium* Sennik. (6). — 14. *Sonchellus* Sennik. (3). — 15. *Ixeridium* (A. Gray) Tzvel. (5). — 16. *Paraixeris* Nakai. (4). — 17. *Sorosseris* Stebb. (8). — 18. *Syncalathium* Lipsch. (6). — 19. *Heteracia* Fisch. et C. A. Mey. (1). — 20. *Garhadiolus* Jaub. et Spach (1).

Подтриба 5. *Lactucinae* Less. (incl. *Sonchinae* Bremer).

21. *Sonchus* L. (7). — 22. *Paramicrorhynchus* Kirp. (1). — 23. *Hexinia* Yang (1). — 24. *Chondrilla* L. (13). — 25. *Prenanthes* L. (2). — 26. *Scariola* F. W. Schmidt (1). — 27. *Mulgedium* Cass. (6). — 28. *Cephalorhynchus* Boiss. (3). — 29. *Cicerbita* Wallr. (3). — 30. *Chaetoseris* Shih (9). — 31. *Steptorhamphus* Bunge (1). — 32. *Lactuca* L. (5). — 33. *Stenosseris* Shih (1).

Подтриба 6. *Scorzonerinae* Dumort.

34. *Podospermum* DC. (1). — 35. *Scorzonera* L. (27). — 36. *Epilasia* (Bunge) Benth. et Hook. f. (2). — 37. *Tragopogon* L. (19).

Подтриба 7. *Taraxacinae* Tzvel. subtrib. nov. — Plantae perennes, lactiferae. Caulis scapiformes, aphylli, cavi. Folia in rosula radicalia. Involucra phylla multiserialia. Achenia subcylindrica, multicostata, rostrata (vulgo rostro longo basi articulato), saepe squamulosa. — Многолетние растения с млечным соком. Стебли стрелкообразные, безлистные, полые. Листья в прикорневой розетке. Листочки обертки многорядные. Семянки почти цилиндрические, многореберные, с носиком (обычно длинным и у основания с сочленением), часто со скульптурой из чешуек. — *Typus* (тип): *Taraxacum* L.

38. *Taraxacum* L. (76).

Далее приводим описания новых таксонов и новые комбинации таксонов различных рангов.

***Cichorium endivia* L. var. *roborovskiyi* Tzvel. var. nov.** — A varietate proxima indica — var. *cosnia* DC. (1838, Prodr. 7, 1 : 84) pubescentia crispata rigida densiore et ramis valde incrassatis differt. — От близкой индийской разновидности — var. *cosnia* DC. — отличается более густым опушением из жестких курчавых волосков и сильно утолщенными ветвями. — *Typus* (тип): «Тянь-Шань, сел. Бугас, 530 м, цв. синие, 20 VIII 1985, N 285, В. И. Роборовский» (LE). — Разновидность названа в память ее коллектора, известного путешественника по Центральной Азии В. И. Роборовского.

По-видимому, является одним из локальных культиваров обычного эндивия.

***Crepis lomonosovae* Tzvel. sp. nov.** — *C. chrysantha* subsp. *minor* (Ledeb.) Lomonosova, 1997, во Фл. Сиб. 13 : 302. p. max. p. (lectotypo excl.). — Planta perennis, rhi-