

## CHICOREÆ.

*H. pumilum* et *H. glabratum*. In apricis crescit. 26. (5) (2).

60. *H.?* *incertum*. Planta undique pilis griseis copiosè tecta, foliis radicalibus petiolatis spathulatis obtusis integris, caulinis numerosis linearibus, calyce hirsutissimo, squamis linearibus.

Caulis simplex uniflorus 2-3 pollicaris; flores desiderantur, planta rursus examinanda. In littoribus. 26. (2) (2).

G. \* 61. *Hypochaeris birenaria*. GAUD.

62. *H. minima*? WILLD.

Planta 2-4 pollicaris, foliis modò runcinatis glandulosò-ciliatis, modò glaberrimis remotè pinnatifidis. Scapi uniflori, calyx imbri-catus subpilosus; pappus plumosus; flos luteus; radix longissima cylindrica. In arenis maritimis. 26. (3) (2).

G. \* 63. *Taraxacum pumilum*. GAUD.

64. *T. leavigatum*. DE CAND. *leontodon leavigatum*. WILLD. PERS.

Plantula glaberrima, scapi 2-3 pollicares ascendentibus, folia runci-nata. In pasquis insulæ *Apteno-dytum* reperitur. 26. (3) (2).

65. *T. coronopifolium*. Calyce erecto hispidulo, squamis interioribus lanceolatis margine scartosis, exterioribus appressis, scapis nudis elongatis unifloris sub flore cano-tomentosis, foliis duplò brevioribus linearibus, remotè seu rare dentato-pinnatifidis basi albo-lanatis; seminibus glabris profundi sulcatis.