

7. CORONILLA trifolia herbacea, leguminibus quinque erectis teretibus articulatis, foliolis undenatis. Linn. Syst. Veget. p. 670.

Numerus undenarius foliolorum, quem Linnaeus in differentia specifica pro signo characteristico habuit, minus constans est. Copiosissime enim variat foliolis novem, duodecim, tredecim, quindecim, immo septendecim in uno ramo. Neque numerus quinarius leguminum semper constans est. Melius et constantius signum praebet *pedunculus inferne pilosus*, quod commode cum reliquis pro charactere specifico adhiberi posset.

8. LATYRUS inconspicuus pedunculis unifloris calyce brevioribus, cirris diphiyllis simplicibus, foliolis lanceolatis. Linn Syst. Veget. p. 662.

Planta mea exacte convenit cum descriptione a Linnaeo in Syst. Plant. Tom. III. p. 464. data, exceptis leguminibus, quae ante maturitatem villosa, dorso et carina pilosa sebriuscula observantur, quae autem maturitate villositatem et scabritatem plane deponunt laeviaque sunt, et foliolis paullo longiora et angustiora sunt, non illis latiora. Flores solitarii in alis petiolorum. Corolla connivens numquam explicatur, vix calyce paullo major. Calycis dentes setacei, inaequales.

### 9. THRINCIA.

*Observatio I.* Dictum est hoc genus a Θρύνος, pinna s. corona murorum; quoniam coronula seminum radij similem formam habet. Ab eodem vocabulo forsitan etiam derivandum est nomen plantae ad finis, Hyoseridis radiatae Linn., TRINCIATELLA, quo usus est Toach. Camerarius in horto med. et philosoph. p. 173.

### 10. COLOBIUM.

CAL. communis ovato-oblongus, octangulus, octophyllus, persistens: foliolis lanceolatis, carinatis, aequalibus; basi calyculatus vel subimbricatus squamis paucioribus, brevissimis, arcte adpresso.

COR. uniformis, imbricata, composita Corollulis hermaphroditis, lingulatis, oblongis, truncatis, quinquedentatis, extus ad faucem villis longis obfessis.

STAM. et PIST. ordinis.

PERIC. nullum. Calyx immitatus, ovato-acuminatus.

SEM. solitaria, oblonga, utrinque attenuata, angulosa, rugosa:

disci pappo stipitato plumoso praedita, deciduo;

radix tot, quot calycis foliola, subincurva, calycis foliolis maxima ex parte inclusa, apice truncata, calyculo brevi paleaceo multidentato obliquo coronata, cum calyce persistentia.

RECEPT. convexo-planiusculum, alveolatum: alveolis coadunatis, truncatis, dentato-aristatis, semine longe minoribus.

*Observat. I.* Essentialis hujus generis character sequens erit: Calyx octangulus, caly-