

198. LEONTODON.

Calyx polyphyllus, foliolis subimbricatis, aut paucis brevibus appressis calyculatus; semina radii et disci, pappo plumoso, sessili, coronata.

I. LEONTODON *tuberum*. Linn.

L. Foliis runcinatis, scabris: calyce acuto, hirsuto: scapis unifloris.

Hab. prope Grandola in Transtagana. Flor. vere. Peren.

Ex Cl. Link.

199. THRINCIA.

(Roth.) Calyx saepius octangulus, rarius decangulus, polyphyllus, calyculatus; foliolis calyculi brevibus, appressis: semina radii truncata, coronâ paleaceâ multidentatâ terminata, calycisque foliolis involuta; disci pappo plumoso praedita, centralia stipitata: receptaculum subalveolosum.

I. THRINCIA *grumosa*.

T. Radice fasciculata: scapis unifloris: foliis runcinatis, hirtis, pilis bifurcis, trifurcatis: calyce saepius piloso, subtorulosso. Broter.

Hab. in agris subarenosis, ad vias, aggeres circa

Co-

Conimbricam , sed infrequentior subsequente. Fl hyeme , vere , et interdum Julio. Peren.

Radix nunc fusiformiter sese in terram trudit , sensim , inter radiculos filiformes , nonnullas (duas ad sex) crassiores , oblongo-tuberosas , aut etiam fusiformes , semper longis filis terminatas , lateraliter ferens ; nunc paulo infra ejus collum , seu caudicem descendenter crassum , radices tres ad quinque fasciculatas , uti Ranunculi quidam , profert , quarum quælibet collo communi valde crassior , aliæ subglobosæ , aliæ napiformes aut fusiformes , aliæ ovales , ut in Asphodelis , aut etiam valde oblongæ , semper filo longo terminatæ , apice et basi angustiores : crassitudine variantes pro soli conditio ne ; in solo raro graciliores , in arenoso-calcareo fere digitæ minimi crassitudinem adpiscentes : plus minusve putrescunt quotannis , aliæ novæ ex ipsis pullulantes , atque etiam , in solo pingui , ex unius individui una plures , perinde ac Ranunculaceæ sese habentes. Folia omnia radicalia quatuor ad sex uncias longa , septem ad quatuordecim lineas superne lata , runcinata semper in omnibus individuis , quæ observavi , obtusiuscula ; laciniis lateralibus integrimis , versus basin curvatis , superne adoras , et subtus ad costam hirta , pilis bifurcis aut non nullis trifurcis , saturate viridia , basi in petiolum attenuata. Scapi plures ex eadem radice , filiformes , sulcati ; præsertim infra medium pilis furcatis adspersi , foliis paulo longiores , uniflori , squamis nudi , rarissime autem pilis. Calyx saepius octophyllus , et pilosus , rarissime glaber , torulis sulcisque octo , rarius decem , basi foliolis paucis , inordinatis , adpressis , calyculatus ; ante florescentiam nutans. Corolla composita lutea , mediocris. Semina intermedia disci interdum pappo sessili plumoso , centralia stipitato , coronata.

Plan-

Planta inter Botanicos nimis dubia : sæpius pro varietate Leont.-hirti Linn., nonnunquam etiam pro varietate Leont.-tuberosi ejusdem Botanici habetur.

2. **THRINCIA hispida.**

T. Radice simplici, fibris non incrassatis : scapis unifloris : foliis oblanceolatis, sinuato-dentatis, hispidis, pilis furcatis : calyce subtoruloso.

Hab. frequentissime cum præcedente, et in tota ferre Lusitania. Flor. hyeme et vere. Ann.

Thrincia-hispida Cl. Roth. Catal. Bot. p. 99.

An Hyoseris-taraxacoides? La Marck. Dict. Bot.?

Variat scapo et calyce nunc glabris, nunc pilosis. Sat similis præcedenti, sed differt radice annua, non fasciculata, foliis nunquam runcinatis, semi-nibus disci intermediis sæpius pappo stipitato instructis.

200. **PICRIS.**

Calyx polyphyllus, breviter calyculatus, calyculi foliolis interdum laxis : semina transversim striata : pappus sessilis.

1. **PICRIS bieracioides.**

P. Foliis scabris, integris : pedunculis squamatis in calycem. Linn.

Hab. in Beira ex *Agueda* ad *Durium*, frequens ad sepes, sylvas, pomaria, in Lusitania boreali. Fl. Julio et Augusto. Peren.

Caulis sesquipedalis et altior, ramosus, angulosus, pilis scaber. Folia alterna, lanceolata, sessilia, amplexicaulia, scabra, undulata, denticulata : calycis foliola laxa, lanceolata, scabra.