

gurata. Pappus sessilis plumosus, radiis omnibus filiformibus conformibus.

367. *PICRIS HIERACIOIDES* L. calycibus ovatis scabriusculis calyculo patulo cinctis, foliis oblongo-lanceolatis dentatis amplexicaulibus asperis, floribus umbellato-corymbosis.

α. *LATIFOLIA*, foliis caulinis ovato-oblongis undulatis.

β. *ANGUSTIFOLIA*, foliis caulinis lanceolatis planis.

In pratis inque vineis abundat.

LXV. LEONTODON L.

(*Gaertn.* t. 159. *Schk.* t. 220.)

Calyx aequalis polyphyllus, basi foliis minoribus adpressis calyculaeformibus cinctus. Receptaculum scrobiculatum nudiusculum. Semina ineffigurata subaequalia. Pappus subsessilis: radii difformes basi paleaceo-dilatati, plumosi.

LXVI. THRINCIA Roth.

(*Catal.* l. 98. *Schk.* t. 220.)

† 368. *THRINCIA LEYSSERI* Wallr. scapo unifloro, foliis oblongo-lanceolatis utrinque pilis bifurcatis hispidis, seminibus centralibus oblongis scabris apice attracto pappo sessili coronatis.

Thrinicia hirta Roth. *cat. bot.* l. 98. *Spreng. hal.* 228. excl. syn. *Curt. Willd. sp. pl.* IV. 1554. excl. syn. plurim. et loc. nat. austral.

Apargia hirta Schk. III. 25. t. 220. opt.
Leontodon hirtum Roth. germ. II. 145.
Leers herb. 172. *Leyss. hal.* 191. —
 nec Linn.

L. hispidum Poll. pal. II. 382.

H. minus dentis leonis folio subaspero Buxb.
hal. 157. excl. syn. *Bauh. et Chabr.*

In pascuis pratisque udis ad Koelme, unweit Barth's
 Weinberg, Kröllwitz, Wansleben et aliis locis.

Buxbaumius Thrinciam nostram primum
 detexit, *Leysserus* denuo introduxit et luc-
 cincte definivit: *Leersius* et *Pollichius*
 optime descriperunt: *Schkuhrius* icone nitida
 expressit; *Rothius* denique differentias a *Ley-*
sero et *Leersio* traditas agnovit et ad genus
 novum adhibuit, — a qua stirps Linnaeana (*Leon-*
todon hirtum *sp. pl.* II. 1123. *H. parvum hirtum*,
 caule aphylo, crispum ubi siccatum *J. Bauh.* II.
 1038. *Chabr. stirp.* 323. f. 1.) et alia australis,
 a cl. *Candollo* descripta (*Thrincia hirta* *DC.*
gall. IV. 51. excl. syn. *Roth. et Gaertn.*), huc-
 dum cum nostra commutatae diversae sunt, et illa
 quidem, ipso *Linnaeo* teste, pilis simplicissi-
 mis, foliis dentatis hirtis, disco (dum exsiccan-
 tur) valde flexuosis, radio corollae utrinque con-
 colore nec subtus virescente: haec, (*H. narbonense*
Chabr. stirp. p. 323 t. 6.) praeter omnium par-
 tium magnitudinem, seminibus centralibus in sti-
 pitem pappophorum conformem attenuatis. — No-
 stra variat partium glabritie et foliorum figura,
Leyssero jam observante.

LXVII. HYPOCHOERIS L.

(*Gaertn.* t. 159. *Schk.* t. 225.)

Calyx oblongus ex foliolis inaequalibus polyphyl-
 lus Receptaculum paleis caducis obsitum. Semi-
 na uniformia in stipitem pappophorum attenuata.
 Pappus plumosus: radii conformes filiformes.