

sit in eadem olla, in qua anno proxime elapsso Daleae species sata fuerit, de patria dubius haereo.

310. *GLYCINE lancifolia*: caule volubili scandente: foliis ternatis: foliolis angusto-lanceolatis glabris, lateralibus obliquis: pedunculis axillaribus solitariis racemoso-quadrifloris.

Habitat in Canariis?

In H. R. M. floret Vere. 5.

CLASSIS XVII. SYNGENESIA.

ORD. I. POLYG. AEQUALIS.

* *Cichoraceae. Juss.*

311. *PICRIDIUM pinnatifidum*: foliis amplexicaulibus oblongis pinnatifidis albo punctatis: pedunculis squamosis incrassatis: anthodiis squarrosis.

Sonchus hispanicus. Fag. Hor. Schoem. 2. pag. 9. tab. 143.

Venit solo arenoso inter sata circa Malacam et in Valentiae Regno.

Floret Vere. ○.

312. *SONCHUS simplicissimus*: pedunculis axillaribus squamosis paucifloris folio brevioribus; foliis oblongis dentato-spinosis: caule simplicissimo.

H. prope *Quintanar de la Orden, Aranjuez oppida*, alibique locis argillosis.

Floret Julio. 4.

313. *SONCHUS scorzoneraeformis*: pedunculis squamosis unifloris: squamis anthodii margine membranaceis: foliis pinnatis, pinna linearibus decurrentibus.

Venit in collibus aridis cretaceis circa Heliocratam, Murciam urbem et alibi in Murciae et Valentiae Regnis. — Floret Vere. 4.

314. *PRENANTHES runcinata*: foliis radiocalibus runcinatis spinulo-ciliatis: ramis divaricatis bifidis: floribus geminis solitariisve suboppositis pedicello squamoso longioribus. — *Sonchus reflexus. El. p. 15.*

Habit. ad saxorum calcareorum rimas in Monte Sancti Michaelis juxta Orcelium, Alonam, Cuevas Ovea oppidum, alibique in Hisp. meridionali. Floret primo Vere. 4.

315. *THRINCIA laevis*: radice fasciculata: foliis, scapis, pedunculis, anthodiisque laevibus glaberrimis.

Habit. in Hispania.

316. *THRINCIA nudicalyx*: calycibus glabris laevibus subdodecaphyllis: foliis lanceolato-oblongis sinuato-dentatis hirtis, pilis furcatis.

Radix simplex: folia obtusa, nonnunquam fere runcinata, subtus praesertim pilis furcatis hirtula.

Venit locis lapidosis, saxisque circa Orcelum.

Floret Januarii et Februarii mensibus. ○?

SOLDEVILLA. Lag.

Char. gen. different.

Anthod. monophyllum, fructiferum basi ventricosum, laciniis tunc in conum convergentibus. *Recept. paleaceum*, paleis multifido-setaceis. *Pappus nullus.*

317. *SOLDEVILLA setosa. Lag. Varied. de*

Cien. an. 2. n. 19. Pers. Enchyrr. bot. 2. p. 348
ubi *calyx communis perperam* dicitur *imbri-catus*. — *Hispidella hispanica. Barnades* secundum. *Cav. Herb. — Lam. Encycl. 3. p. 134.*
Hab. in locis arenosis aridis in utraque Castella. ○.

** *Cynarocephalae Juss.*

318. *CARTHAMUS hircinus*: caule erecto hirsuto subbifloro: foliis amplexicaulibus pubescentibus ovato-lanceolatis sinuatis spinoso-dentatis pungentibus.

Carth. arborescens Linn?

Venit ad montium radices circa Malacam, Orcelim, Murciam urbem, alibique in Murciae, Valentiae et Granatae Regnis. — Odorem hircinum spirat.

Floret ultimo Aprili et Majo. 5.

Vulgo *Cardo cabrero* Orcelitanis audit.

319. *CIRSIUM cernuum*: foliis subamplexicaulibus lanceolatis sinuato-pinnatifidis spinosis subtus arachnoideis: calicibus arachnoideo-tomentosis cernuis.

Cirsium cernuum. Elench. H. R. M. ann. 1805.

Habitat in Imperio Mexicano. 4.

320. *CIRSIUM horridum*: arachnoideum: caule erecto subtrifloro: foliis semiamplexicaulibus spinosis bifariam pinnatifidis, laciniis profundissimis lanceolato-subulatis, integris: calycibus longe valideque spinosis. *Lag. Varied. ann. 2. n. 22 pag. 214.*

Legi in Granatensi Regno juxta viam, quae ab *Albama* ad *Velez-Malaga* dicit, prope la *Venta alta*. — Floret Autumno. 4. — *Corolla alba.*

321. *STHAELINA pinnata*: tomentosa: foliis pinnatis, pinnulis linearibus decurrentibus margine revolutis; pedunculis unifloris.

Habitat in Extremadura, Mancha et Granatensi Regno, alibique in Hispania meridionali.

Floret Junii, Julii et Augusti mensibus. 4.

* * * *Discoideae. Linn.*

G. N. PODANTHUS.

Ord. nat. *Corymbiferae Juss.*

Char. gen.

Anthod. subimbricatum, parvum, multiflorum. *Flosculi* pedicellati, 5-dentati, aequales. *Recept. paleaceum*. *Pappus coronula dentata.*

322. *POD. ovatifolius. Frutex* ramis subangulatis, trichotomis, junioribus pubescens. *Folia opposita*, breviter petiolata, ova-ta, acutiuscula, scaberrima, subtus subpubescentia. *Pedunculi* terminales, terni, uniflori, subpollicares, dense villoso, in fructu elongati sesqui-bipollicares.

Hab. circa *Concepcion* urbem, et prope *Chillan* oppidum Regni Chilensis, ubi vernacule *Palo negro* nuncupatur, uti ex sche-dula cel. *Ludovici Nee* constat.

G. N. CALYDERMOS.

Ord. nat. *Jus. Corymbiferae.*

Char. gen. different.

Anthod. oblongum, imbricatum, scario-sum. *Corolla flosculosa*, flosculis 5-dentatis.