

summis ciliato-crinitis: floribus corymbosis: anthodiis hirsutissimis, comatis; squamis crinitis.

Crepis comata, *Herb. Banks. et Sol. MSS!*

“Hab. in Maderæ sylvis; Fr. Masson 1777.” *Sol.*

Pappus distinctissimè stipitatus.

GEN. THRINCIA, *Roth, Spr.*

47. *Thrinicia nudicaulis, Prodr. MS.*

T. foliis hispidis, sub-dentato-sinuatis: pappo disci stipitato.

Leontodon nudicaule, Herb. Banks!

Hab. in apricis Maderæ ubique; vulgatissima.

Flosculorum tubulus ad apicem pilosus; ligulorum lacinia eglandulosæ. Pappus radii paleaceus; disci plumosus. Semina sursùm attenuata, acuminata, in rostrum gracile, elongatum producta; unde pappus stipitatus.

Thrinicia hirta Hook. Brit. Fl. (*Apargia hirta Sm. Eng. Fl., Hedynois hirta Ejusd. in Engl. Bot.*) pappo disci sessili, potissimùm differt. Eodem caractere, necnon genere, sc. pappo radii paleaceo, ab *Apargiâ hispida* omninò distincta.

* * CINAROCEPHALÆ

GEN. CIRSIUM, *Tourn, Spr., &c.*

(CNICUS, *Aliorum*).

48. *Cirsium latifolium, Prodr. MS.*

C. inerme: foliis sessilibus, basi auriculatis, amplexicaulibus, omnibus elliptico-oblongis, latis, obtusis, indivisis, latè sinuato-crenatis, setoso-spinelloso-ciliatis, supra lucidis, nudis, subtus cauleque lanato-tomentosis, floccosis: pedunculis longissimis, floccosis, unifloris: anthodiis sub-lanatis: squamis lanato-ciliatis, mucronatis, adpressis, inferioribus ovatis, acutis; superioribus oblongis, obtusiusculis.

Carduus latifolius, Herb. Banks!