

Obs. Praecedente robustior, albastrum globosum, scapus multisulcatus.

DCCXLIX. 994. *Thrincia hirta* RTH.
foliis lanceolatis sinuato-dentatis, pilis simpliciusculis, anthodio squamis 10—12. ovato-ventricoso. *RCHB. Fl. germ. excurs. n. 1640. cum syn.*

Hist. 994. e Lusitania: cl. HOLL.

A. flosculus. B. rec. cum acheniis et anthodii squama. C. alveoli. D. achen. marginale. E. achénii disci apex cum radiis pappi. F. folii apex. G. segmentum e scapo.

Obs. Hujus pilos dicunt simples, caute tamen inspecti epice subtiliter bifidi sunt pro more affinium. Varietas anthodio glabro est *Th. psilocalyx* LAG. cuius in horto cultae scapos binos addidi sub fig. 995.

DCCL. 996. *Gnaphaliu m alpinu m* L.
radice sarmentosa, foliis radicalibus obovato-, caulinis linearis-lanceolatis, capitulis terminalibus paucis aggregatis, anthodii squamis interioribus elongatis acutis crenulatis fusculis.

Syn. *G. alpinu m* LINN. suec. n. 737. lapp. n. 301. WAHLENB. lapp. 379. suec. 911. nec Florist. Germ. Helv. etc.

Hist. 996. in Norweg. alp. Dovrefield: cl. SCHUBERT.

A. anthodium. B. flosculus.

Obs. Planta paucis cognita, ab ipsis quibusdam botanicis borealibus, qui utrumque legunt, cum *Gn. carpathico* VHLNB. confusum, quod in *Fl. germ. excurs.* sub no. 1398. exposuimus. Conferas cum figura nostra veri *G. alpinu m*, illam *G. carpathici* VHLNB. carp. t. 3. et (*G. alpinu m falsi*) ap. STURM, fasc. 38. —

Beob. Kräftiger gebaut als vorige, Knospe kugelrund, Schaft vielfurchig.

DCCXLIX. 994. *Thrincia hirta* RTH.
Blätter lanzettlich bogig - gezähnt, Haare fast einfach, Hülle bauchig - eiförmig aus 10—12 Schuppen. *Vgl. RCHB. Fl. germ. excurs. n. 1640. nebst Syn.*

Nachr. 994. aus Portugal: HOLL.

A. Blüthchen. B. Fruchtboden nebst Früchtchen und einer Hüllschuppe. C. Grübchen aus dem Fruchtb. D. Randfrüchtchen. E. Spitze eines Scheibenfrüchtchens nebst Pappusstrahlen. F. Blattspitze. G. Schaftdurchschnitt.

Beob. Man giebt an, die Haare dieser Art wären einfach, indessen wenn man sie genau ansieht, bemerkt man, dass sie wenigstens an der Spitze fein zweispaltig sind. Abänderung mit ganz kahler Blüthenhülle, ist *Th. psilocalyx* LAG. Diese habe ich cultivirt und unter Fig. 995. abgebildet.

DCCL. 996. *Gnaphaliu m alpinu m* L.
Wurzel mit Ausläufern, Wurzelblätter umgekehrt eirund, Stengelblätter linearisch - lanzettlich, Köpfchen endständig, wenigzählig, zusammengehäuft, innere Hüllschuppen lang, spitzig, feingekerbt, bräunlich.

Syn. *G. alpinu m* LINN. suec. n. 737. lapp. n. 301. WAHLENB. lapp. 379. suec. 911. nec Florist. Germ. Helv. etc.

Nachr. 996. auf der Norweg. Alpe Dovrefield: D. SCHUBERT.

A. Blüthenhülle. B. Blüthchen.

Beob. Diese Pflanze kennen nur Wenige, selbst nordische Botaniker nehmen *G. carpathicum* VHLNB. dafür, da bei ihnen beide wachsen. Ich habe sie in der *Fl. germ. excurs.* unter no. 1398 auseinander gesetzt. Man vergleiche nun unsre ächte Pflanze mit der Abbildung von *G. carpathicum* VHLNB. carp. t. 3 und mit der (falschlich als *G. alpinu m* bezeichneten) bei STURM Heft 38.



Thrinaxia hirta. RTH.
— 995. *Th. psilocalyx*. LAG.—

Hum. del.

Ch. Schnorr. sc.