

Caulis brevissimi, calathidiis 1—10 ferens. Achenia compressa, costis 10—15, apice attenuata vel breviter rostrata. — Typus: *T. depressa* (Hook. f. et Thoms.) Sennik. comb. nov. (= *Youngia depressa* Hook. f. et Thoms., 1882, in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3 : 397). — Автор этого рода, А. Н. Сенников, приводит здесь лишь очень краткий диагноз описываемого им нового рода и новую комбинацию для его типового вида. Более полный диагноз рода и обоснование его выделения будут даны им позднее в журнале «Комаровия».

***Tibetoseris angustifolia* Tzvel. sp. nov.** — Planta perennis, rhizomatosa. Folia in rosula radicalia, in numero 3—8, 1.5—8 cm lg., sensim in petiolum brevem anguste alatum abeuntia, pinnatilobata vel pinnatifida, in ambitu lineari-oblancoolata, sparse crispate pilosa, canescenti-viridia. Caulis brevissimus, a basi ramosus, calathidia (1) 2—5 ferens. Pedunculi tenues et sat longi, paulo arachnoideo-tomentosi. Involucra 9—10 mm lg., subglabra, atro-viridia; phylla externa lanceolata vel lanceolato-ovata, internis a 4—6-ies breviora; phylla interna partim apice breviter corniculata. Calathidia 2.5—3.3 cm in diam. Flores flavi, tubo glabro, involucro 1.5—3-ies longiores. Achenia immatura pappo ca. 6 mm lg. — Многолетнее корневищное растение. Листья в прикорневой розетке, в числе 3—8, 1.5—8 см дл., постепенно суженные в короткий узкокрылатый черешок, перистолопастные или перистораздельные, в очертании линейно-обратноланцетные, рассеянно курчаво-волосистые, серовато-зеленые. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, несущий (1) 2—5 корзинок. Ножки корзинок тонкие и довольно длинные, немного паутинисто-войлочные. Обертки 9—10 мм дл., почти голые, темно-зеленые; наружные листочки обертки ланцетные или ланцетно-яйцевидные, в 4—6 раз короче внутренних; внутренние листочки отчасти на верхушке с небольшими рожками. Корзинки 2.5—3.3 см в диам. Цветки желтые, с голой трубкой, в 1.5—2 раза длиннее обертки. Семянки незрелые с пappусом около 6 мм дл.

Typus (тип): «Kam (Tibet), systema fl. Jan-tzy-tzsjan (Golubaja), in cursu superiore fl. J-czju, 13 000 ft., in fissuris rupium, flores flavi odorati, 29 VII 1900, N 432, V. F. Ladygin» (LE).

Affinitas (родство). A speciebus proximis — *T. cristata* (Shih et Cai) Sennik. et *T. gracilipes* (Hook. f.) Sennik. foliis multo angustioribus, lobo terminale longissimo et angusto differt. — От наиболее близких видов — *T. cristata* и *T. gracilipes* отличается значительно более узкими листьями с очень длинной и узкой конечной долей.

По-видимому, этот вид встречается в северо-восточных районах Тибета и в прилежащих районах Цинхая, тогда как наиболее близкий к нему вид *T. cristata* приурочен к юго-восточному Тибету (он описан из окрестностей г. Чаюй в бассейне р. Брахмапутры), а другой близкий вид — *T. gracilipes* — к южному Тибету. Кроме оригинальной формы листьев *T. angustifolia* отличается от *T. cristata* слабо войлочными ножками корзинок, а от *T. gracilipes* — присутствием рожков на некоторых из листочков обертки.

***Tibetoseris ladyginii* Tzvel. sp. nov.** — Planta perennis, rhizomatosa, 2—5 cm alta. Folia in rosula radicalia, in numero 5—12, 1.5—4 cm lg., sensim in petiolum brevem anguste alatum abeuntia, pinnatilobata vel integra, in ambitu late oblancoolata, sparse crispate pilosa vel subglabra, canescenti-viridia. Caulis brevissimus, a basi ramosus, calathidiis 1—7 ferens. Pedunculi sat crassi et breves, paulo arachnoideo-tomentosi. Involucra 11—14 mm lg., glabra vel subglabra, phyllorum internorum apicibus excludo, atro-viridia; phylla exteriora late lanceolata vel ovata, internis 2.5—3-ies breviora. Calathidia 2.5—3.5 cm in diam. Flores flavi, odore vanillosa, tubo glabro, involucro 1.5—2-ies