

Caulis brevissimi, calathidiis 1—10 ferens. Achenia compressa, costis 10—15, apice attenuata vel breviter rostrata. — Typus: *T. depressa* (Hook. f. et Thoms.) Sennik. comb. nov. (= *Youngia depressa* Hook. f. et Thoms., 1882, in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3 : 397). — Автор этого рода, А. Н. Сенников, приводит здесь лишь очень краткий диагноз описываемого им нового рода и новую комбинацию для его типового вида. Более полный диагноз рода и обоснование его выделения будут даны им позднее в журнале «Комаровия».

***Tibetoseris angustifolia* Tzvel. sp. nov.** — Planta perennis, rhizomatosa. Folia in rosula radicalia, in numero 3—8, 1.5—8 cm lg., sensim in petiolum brevem anguste alatum abeuntia, pinnatilobata vel pinnatifida, in ambitu lineari-oblancoolata, sparse crispate pilosa, canescenti-viridia. Caulis brevissimus, a basi ramosus, calathidia (1) 2—5 ferens. Pedunculi tenues et sat longi, paulo arachnoideo-tomentosi. Involucra 9—10 mm lg., subglabra, atro-viridia; phylla externa lanceolata vel lanceolato-ovata, internis a 4—6-ies breviora; phylla interna partim apice breviter corniculata. Calathidia 2.5—3.3 cm in diam. Flores flavi, tubo glabro, involucro 1.5—3-ies longiores. Achenia immatura pappo ca. 6 mm lg. — Многолетнее корневищное растение. Листья в прикорневой розетке, в числе 3—8, 1.5—8 см дл., постепенно суженные в короткий узкокрылатый черешок, перистолопастные или перистораздельные, в очертании линейно-обратноланцетные, рассеянно курчаво-волосистые, серовато-зеленые. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, несущий (1) 2—5 корзинок. Ножки корзинок тонкие и довольно длинные, немного паутинисто-войлочные. Обертки 9—10 мм дл., почти голые, темно-зеленые; наружные листочки обертки ланцетные или ланцетно-яйцевидные, в 4—6 раз короче внутренних; внутренние листочки отчасти на верхушке с небольшими рожками. Корзинки 2.5—3.3 см в диам. Цветки желтые, с голой трубкой, в 1.5—2 раза длиннее обертки. Семянки незрелые с пappусом около 6 мм дл.

Typus (тип): «Kam (Tibet), systema fl. Jan-tzy-tzsjan (Golubaja), in cursu superiore fl. J-czju, 13 000 ft., in fissuris rupium, flores flavi odorati, 29 VII 1900, N 432, V. F. Ladygin» (LE).

Affinitas (родство). A speciebus proximis — *T. cristata* (Shih et Cai) Sennik. et *T. gracilipes* (Hook. f.) Sennik. foliis multo angustioribus, lobo terminale longissimo et angusto differt. — От наиболее близких видов — *T. cristata* и *T. gracilipes* отличается значительно более узкими листьями с очень длинной и узкой конечной долей.

По-видимому, этот вид встречается в северо-восточных районах Тибета и в прилежащих районах Цинхая, тогда как наиболее близкий к нему вид *T. cristata* приурочен к юго-восточному Тибету (он описан из окрестностей г. Чаюй в бассейне р. Брахмапутры), а другой близкий вид — *T. gracilipes* — к южному Тибету. Кроме оригинальной формы листьев *T. angustifolia* отличается от *T. cristata* слабо войлочными ножками корзинок, а от *T. gracilipes* — присутствием рожков на некоторых из листочков обертки.

***Tibetoseris ladyginii* Tzvel. sp. nov.** — Planta perennis, rhizomatosa, 2—5 cm alta. Folia in rosula radicalia, in numero 5—12, 1.5—4 cm lg., sensim in petiolum brevem anguste alatum abeuntia, pinnatilobata vel integra, in ambitu late oblanceolata, sparse crispate pilosa vel subglabra, canescenti-viridia. Caulis brevissimus, a basi ramosus, calathidiis 1—7 ferens. Pedunculi sat crassi et breves, paulo arachnoideo-tomentosi. Involucra 11—14 mm lg., glabra vel subglabra, phyllorum internorum apicibus excludo, atro-viridia; phylla exteriora late lanceolata vel ovata, internis 2.5—3-ies breviora. Calathidia 2.5—3.5 cm in diam. Flores flavi, odore vanillosa, tubo glabro, involucro 1.5—2-ies

longiores. Achenia immatura pappo 9—12 mm lg. — Многолетнее корневищное растение 2—5 см выс. Листья в прикорневой розетке в числе 5—12, 1.5—4 см дл., постепенно переходящие в короткий узкокрылатый черешок, перистолопастные или цельные, в очертании широко-обратноланцетные, рассеянно курчавоволосистые или почти голые, серовато-зеленые. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, несущий 1—6 корзинок. Ножки корзинок довольно толстые и короткие, немного паутинисто-войлочные. Обертки 11—14 мм дл., голые или почти голые, исключая верхушки внутренних листочков обертки, темно-зеленые; наружные листочки обертки широколанцетные или яйцевидные, в 2.5—3 раза короче внутренних. Корзинки 2.5—3.5 см в диам. Цветки желтые, с ванильным запахом, с голой трубкой, в 1.5—2 раза длиннее обертки. Незрелые семянки с папусом 9—12 мм дл.

Турус (тип): «Kam (Tibet), systema Fl. Jan-Czy-Czjan (Golubaja), locus Nru-czju ad fl. Golubaja, 11700 ft., fl. flavi odore vanillosa, 25 VII 1900, N 380, V. F. Ladygin» (LE).

Paratypi (паратипы): «Тибет, песчаный берег оз. Джарин-гол, 21 VIII 1884, N 349, Н. М. Пржевальский»; «сев. склон Южно-Кукунорского хребта, 4000—4300 м, 27 VIII 1984, В. И. Роборовский»; «бассейн р. Ян-Цзы-Цзян, истоки р. И-чю, оз. Рхомбо-Мцо, 4300 м, 1 VIII 1900, В. Ф. Ладыгин»; «хр. Бурхан-Будда, сев. склон, ущелье Хату, 4500 м, 17 VII 1901, он же»; «вост. оконечность Нань-Шаня, перевал по дороге из Кулона в Лань-Чжоу, 3950 м, 12 VIII 1958, М. П. Петров» (LE).

Affinitas (родство). A speciebus proximis differt: a *T. simulatrix* (Babc.) Sennik. — pedunculis pilosis et calathidiis minoribus, a *T. parva* (Babc. et Stebb.) Sennik. — involucri phyllis intus glabris et pedunculis paulo arachnoideo-tomentosis. — От наиболее близких видов отличается: от *T. simulatrix* — волосистыми ножками корзинок и более мелкими корзинками; от *T. parva* — голыми с внутренней стороны листочками обертки и немного паутинисто-войлочными ножками корзинок.

Вид назван в память его коллектора, известного путешественника по Центральной Азии — В. Ф. Ладыгина.

В отличие от близких видов этот вид приурочен к Сев.-Вост. Тибету и Цинхаю.

Tibetoseris tianschanica (Shih) Tzvel. comb. nov. — *Crepis tianschanica* Shih, 1995, Acta Phytotax. Sin. 33 : 190; Shih, 1997, in Fl. Sin. 80.1 : 124, tab. 29, fig. 4; An, 1999, in Fl. Xinjiang. 5 : 463. — Этот вид распространен в горах Вост. Тянь-Шаня, и его ареал значительно удален от основного ареала рода. Его автор относил этот вид к роду *Crepis* L., но он явно принадлежит к роду *Tibetoseris*.

Askellia W. Weber, 1984, Phytologia, 55.1 : 6. — *Crepis* sect. *Ixeridopsis* Babc. 1947, Univ. Calif. Publ. Bot. 22 : 212. — Следуя А. Н. Сенникову (устное сообщение), мы принимаем этот род для Центральной Азии.

***Askellia ladyginii* Tzvel. sp. nov.** — Planta perennis, minuta, 2—5 cm alta, rhizomatosa, glabra, caespites parvos formans. Caules brevissimi, tenues, foliis 1—2 ferentes. Folia praesertim radicalia vel subradicalia, 1—4 cm lg., longe petiolata, in ambitu anguste lanceolata, pinnatifida vel pinnatilobata, rarius partim integri. Calathidia in numero (1)2—10 in caulibus. Involucri 7—8 mm lg., anguste campanulata, atroviridia; phylla externa in numero 3—6, interioribus 4—6-ies breviora. Flores flavi. Achenia immatura apice angustata, pappo 6—7 mm lg. — Очень мелкое голое многолетнее корневищное растение 2—5 см выс., формирующее небольшие дерновинки. Стебли очень короткие, тонкие, с 1—2 листьями. Листья преимущественно прикорневые или