

ciminibus prope *Perpignan* lectis et in herbario dom. E. Miciol visis, a præcedentibus speciebus, et præsertim a duabus ultimis, quibus capitulis discoloribus propior, facile distinguitur calyculi foliolis involucrum longe superantibus, capitulis valde amplioribus, et akeniis plerumque bisetis nec quadrisetis.

Tolpis barbata Reich., *Ic. flor. germ.*, 1359, n° 1, ad *Tolpidem bæticam* minime spectat, ut cl. Willkomm et Lange in *Prodr. flor. hisp.* immerito citant, sed potius *T. discolori* nostræ congruit.

T. barbata Biv. Bern., *Monogr. delle Tolpide*, p. XIII, tab. 3, quæ capitulis centro atropurpureis prædita est, ad *T. bæticam* non accedit. Eam Bertolonius ad *T. umbellatam* suam, propter akenia quadriseta, in *Flor. ital.* VIII, p. 54, ut synonymum refert; sed a speciebus nostris supra descriptis pluribus notis discrepat. A *T. discolori* et *T. dichroa* differt foliis conspicue latioribus, caule magis foliato robustiore, capitulisque majoribus. *T. Bivonæ* nomine designandam censemus. Specimina gallica prope *Cannes (Alpes maritimes)* lecta vidimus, ad hanc probabiliter referenda.

T. quadriarista Biv. Bern., *loc. cit.* p. IX, t. I. — Guss. *Syn. flor. sic.*, II, p. 415, ad *T. umbellatam*, in Bertol., *Flor. ital.* VIII, p. 54, pessime relata, speciem sistit a præcedentibus abunde diversam.

***Odontis* Hall. species. — Grex *Euphrasie*
viscosæ L.**

ODONTITES ALPESTRIS, racemis laxiusculis; calyce oblongo-obconico virente, pilis mixtis eglandulosis crebrioribus obtecto, vix ad medium bilabiato, lobis ovatis vel ovato-lanceolatis, acutiusculis; corollæ luteæ tubo incluso, labio superiore apice truncato, labii inferioris lobo intermedio aperte emarginato; stylo glabro, vix basi pilosiusculo; capsula calycem paulo excedente, fere obovata, apice haud emarginata; foliis patentibus demum subdeflexis, lineari-lanceolatis, acutis, integris vel utroque margine dente unico præditis, viridibus, undique pilis brevibus sparsis glanduliferis obsitis; caule a basi declinata ascendente, surrecto, stricto, pilis glandulosis pubesque minuta subreversa eglandulosa obtecto, ramosissimo, ramis erecto-patulis.

Hab. in sylvis montium Galliæ orientalis: *Briançon (Hautes-Alpes)*.