

linis angustioribus, superioribus linearibus abbreviatis integris; caule tenui, erecto, plerumque a basi ramoso, ramis valde patentibus etiam divaricatis.

Hab. in insulis Canariensibus.

Species capitulis parvis, dilute luteis, habitu gracili divaricato, caule patenter ramoso conspicua.

TOLPIS PALLIDIFLORA, calyculi foliolis involucrum valde superantibus; capitulis concoloribus, pallide sulfureis, ligulis exterioribus involucri duplo longioribus; foliis breviter et sat remote dentatis, radicalibus subcuneatis oblongatis apice obtuso subapiculatis, caulinis inferioribus obverse lanceolatis, superioribus linearibus integris; caule gracilescente, erecto, ramis erecto-patulis.

Hab. in incultis Algeriæ: prope Constantinam, ex dom. A. Joannon.

A præcedente differt foliis latioribus et obtusioribus, breviter et remote dentatis, capitulis paulo majoribus, pallidius luteis, involucri minus furfuraceo, caulibusque minus ramosis.

TOLPIS CONCOLOR, calyculi foliolis involucrum paulo excedentibus; capitulis concoloribus, ligulis sulfureis, exterioribus involucri superantibus; foliis breviter et sat crebre dentatis, radicalibus oblongo-lanceolatis, apice acutis, caulinis angustioribus, superioribus sublinearibus integris; caule erecto, superne tantum vel passim a basi ramoso, ramis arrectis substrictis modice patulis.

Hab. in incultis Galliæ australis: *Béziers (Hérault), etc.*

Planta plerumque stricte erecta, habitu proceriore, foliis latiusculis breviter et crebre dentatis capitulisque intensius luteis ab antecedente distinguenda.

TOLPIS MACRODONTA, calyculi foliolis involucri paulo excedentibus; capitulis concoloribus, ligulis sulfureis, exterioribus