

6. *T. LAGOPODA* (Chr. Smith! in Buch can. 147), caule angulato erecto apice paniculato ad basin vellere densissimo donato cæterum glabro, foliis subsessilibus oblongis basi attenuatis sinuato-dentatis glabris, pappo 6-10-aristato. (2) 2℥ in ins. Teneriffæ regione Pini suprâ villam Orotavam legit cl. Chr. Smith. Invol. squamæ ext. breves parvæ adpressæ, int. tomentosæ ad carinam glabræ. (v. s. comm. à cl. inv.)
7. *T. MACRORHIZA*, glaberrima, radice crassâ carnosâ, caulibus supernè paniculatis foliatis, foliis indivisis oblongis dentatis sessilibus subcarnoso-coriaceis, paniculâ amplâ, invol. farinoso-pubescentibus, pappo 15-20-setoso. 2℥ in Maderæ rupibus. *Crepis macrorhiza* Banks herb. Hook. bot. mag. t. 2988. Lowe! prim. fl. mad. p. 25. n. 40. Pedicellisquamellosi. Capit. flava, magnit. ferè *T. barbata*. (v. s. comm. à cl. Lowe.)
8. *T. FRUTICOSA* (Schrank pl. rar. h. monac. 1. t. 46), glabra, caule fruticoso ramoso, foliis oblongis dentatis breviter petiolatis, invol. tomentoso-canescente, squamis accessoriis brevibus, pappo circ. 12-setoso. 5 in Maderæ (Schr.) rupibus maritimis (Lowe!). *Hieracium fruticosum* Willd. sp. 3. p. 1591. Desf. h. par. *Crepis succulenta* Ait. kew. ed. 1. v. 3. p. 128 ex Lowe! in litt. *Schmidtia fruticosa* Moench suppl. 218. (v. v. et s.)
9. *T. PECTINATA*, caule suffrutescente ramoso foliato, ramis diffusis virgatis, foliis pinnatipartitis, rachi lobisque lineari-filiformibus elongatis integerrimis, invol. canescente basi brevissimè squamellato, pappo 10-12-setoso. 5 in rupibus apricis Maderæ ubique. *Crepis pectinata* Lowe! prim. fl. mad. p. 24. n. 37. *Crepis tenuifolia* Banks herb. non Willd. Fol. lobi 5-7-jugi. Capit. duplò majora quàm *T. coronopifoliæ* cui tamen affinis. (v. s. comm. à cl. inv.)
10. *T. CORONOPIFOLIA* (Biv. monogr. p. 17. t. 5), glabra, caule erecto laxè ramoso infernè folioso, foliis pinnatifidis basi attenuatis, lobis lineari-oblongis subintegerrimis, foliis summis linearibus integerrimis, invol. canescente, pappo 5-10-setoso. (2) in ins. Canariis (Desf. Link) neo in Siciliâ. *Crepis coronopifolia* Desf. act. soc. h. n. par. 1. p. 38. t. 9. *Chondrilla hieracioides* Roth. cat. 1. p. 101. (v. v. et s.)
11. *T. CRITHMIFOLIA*, glabra, caule erecto laxè ramoso infernè folioso, foliis infer. bipinnatifidis, lobis oblongo-linearibus dentatis, superioribus pinnatipartitis lobis angustè linearibus integerrimis, invol. canescente, squamis exter. brevissimis, pappo 10-12-setoso. (1) in ins. Teneriffæ aridis calidis (C. Smith!) *Crepis crithmifolia* Link in Buch can. 147. Affinis *T. coronopifoliæ* et cum eâ à nonnullis conjuncta, sed duce cl. Link servanda videtur. (v. s.)
12. *T. FILIFORMIS*, foliis lineari-filiformibus integerrimis glabris. (2) in Maderâ. *Crepis filiformis* Ait. kew. ed. 1. v. 3. p. 128 non Viv. *Æthionia filiformis* Don in linnæâ 1830. p. 142. †.

DCCLXXXVIII. *FICHTEA* Schultz in linnæâ 1835. p. 254. — *Hyoseridis* sp. Poepp.

Capitulum multiflorum. Invol. calyculato-subimbricatum, squamis exter. 7-8 adpressis, inter. 1-seriatis. Recept. nudum. Achænia eros-tria. Pappus duplex, ext. brevis paleaceus, inter. setis 5 scaberrimis elongatis rufis deciduis. — Herba humillima Chilensis annua. Folia radicalia glabra aut cum apice scapi furfuracea pinnatipartita, rachi lobisque 7-8-jugis linearibus acutis, terminali paulò cæteris longiore. Scapi foliis paulò breviores nudi 1-cephali. Ligulæ angustæ in sicco è pallido et cœrulescenti variæ. — Genus affine *Krigiæ*, sed invol. calyculato et pappo facilè distinctum.

1. *F. POEPPIGII* (Schult. l. c.). (1) in Chili detexit cl. Poeppig. *Hyoseris tenella* Poepp. pl. exs. n. cexli. (v. s.)