

# TOLPIDE QUADRIRESTATA

T A V. I.



**TOLPIDE** *Quadrirestata*. Foglie inferiori lanciolate, dentate. Squame del calicetto aperte. Semi per lo più quadrirestate.

**TOLPIS** *Quatriaristata*. Foliis inferioribus lanceolatis, dentatis. Calyculi squamis laxis. Seminibus plerumque quatriaristatis.

*Hieracium Cichorii sativi folio integro, denticulato; curvo, glaucescens* Cup. Panph. 2. t. 228. — Bonann. t. 118.

*Hieracium Cichorii sativi folio, denticulato, curvo, diuturnè florens, incanum* Cup. Hort. Cath. p. 96.

Da una radice fusiforme, lattiginosa, grossa quattro linee circa, e coperta quà e là di fibrette tortuose, s'innalza uno o più fusti dritti, sottili, quasi verghettati, alti da un piede e mezzo fino a due piedi e più, angolati, solcati, fogliosi nella parte inferiore, cotonosi verso la base, in tutto il resto glabri.

Le foglie radicali sono ellittico-lanciolate, picciolate, dentate, con i denti acuti, ora poco ed ora molto profondi, lunghe da cinque a sei pollici, da un pollice ad un pollice e mezzo larghe, dapprima pubescenti e di un verde allegro, in seguito bianco-cinericie; le cauline inferiori sono simili alle radicali, ma più piccole; quelle finalmente che guarniscono la base de' rami superiori e de' peduncoli pajono pezzettini di foglia strettissimi ed appuntati.

*Radix fusiformis, lactiginosa, quatuor lineas circiter crassa, fibrillis tortuosis vagè obsita.*

*Caulis ex ea unus pluresve, erecti, graciles, subvirgati, a sesquipede ad duos pedes et ultra alti, angulati, sulcati, infernè foliosi, basin versus tomentosi, supernè glabri.*

*Folia radicalia elliptico-lanceolata, petiolata, dentata, dentibus acutis, plus minus profundis, quinque vel sex pollices longa, pollicem vel sesquipollicem lata, primum pubescentia ac laetè viridia, subinde albo-cinerea; caulina inferiora radicalibus conformia, sed minora; reliqua ac si ramenta angustissima, acuta, ramorum superiorum, nec non pedunculorum divisiones munientia.*

I peduncoli sono sottili, alterni, quasi triforcati, e muniti verso l'apice di squamette lesiniformi; il peduncolo di mezzo è corto, semplice, e si sviluppa sempre prima de' peduncoli laterali; questi dopo che s'inalzano al disopra di quello, suddividonsi conformemente in tre altri pedicelli.

I fiori sono solitarii in cima de' peduncoli, del diametro di un pollice, di color di cedro, col disco qualche volta porporino scuro, e chiudonsi avanti mezzogiorno.

Il calice è a due serie non ben determinate di foglioline, farinoso, e calicettato. Le foglioline interne o calicinali sono quasi uguali tra di loro, carenate, sottilmente appuntate; le squame del calicetto lesiniformi, ineguali, aperte, un poco o la metà più brevi del calice interno.

Le linguette delle corolle sono lineari, striate, glabre nella pagina superiore, villose nella inferiore come anche nel tubo, e terminano con cinque denti, che di sotto sono ricoperti di piccolissime glandule purpuree: le linguette del raggio sono inoltre rosseggianti nel dorso, e il doppio più lunghe del calice.

Le semenze sono fosche, piramidali al rovescio, tetragone, striate, e coronate d'un sol giro di brevissimi peli, ai quali sono framischiati per lo più quattro, qualche volta cinque o sei filetti seracei e scabri.

Il ricettacolo è alveolare con i margini delle fossette appena dentellati.

E' qui comune lungo i viali, e per le strade di campagna. Cresce ancora sopra le colline calcari di *Messina*, in varii luoghi del Monte *Etna*, e particolarmente vicino le *Caselle*, il *Milo* etc. Fiorisce nel Giugno e nel Luglio.

*Pedunculi graciles; alterni; subtrifurcati, squamulis subulatis apice muniti; centralis brevis, indivisus, præcocior; laterales longiores; iterum eodemque modo trifurcati.*

*Flores in apice pedunculorum solitarii, pollicem in diametro lati, citrini, disco quandoque fusco-purpurascente, ante meridiem clausi.*

*Calyx subduplici serie polyphyllus, farinosus, calyculatus. Foliola interiora vel calycinalia subæqualia, carinata, subtiliter acuta. Calyculi squamæ subulatæ, laxæ, inæquales, calyce interno dimidio vel paulo breviores.*

*Ligulæ lineares, striatæ, supernè glabræ, infernè sic ut et tubo villosæ, apice quinquedentatæ, dentibus subtus glandulis purpurascensibus tectis: radii præterea dorso rubescentes, calyceque duplo longiores.*

*Semina fusca, obpyramidalia, tetraquetra, striata, simplici serie coronata ciliis brevissimis, intermistis setis plerumque quatuor, quandoque quinque aut sex, scabris.*

*Receptaculum alveolare, serobiculis margine obsolete denticulatis.*

