

tiore per Sahara Algeriensem australem primis legit dicatur. — Ferrakderia differt a Jasonia foliis involucri exterioribus longioribus omnino foliaceis lineariteretiusculis, corollis fere a basi sensim ampliatis, staminum filamentis ad imam corollam insertis, antherarum caulis subdivisis nec laceris, acheniis teretiusculis, nec oblongo-teretiusculis, a basi ad apicem dense longaque villosis villis superioribus pappum exteriorem occultantibus, apice in collum brevissimum abrupte contractis, et habitu plane aliens.

Vieraea Webb *Phyt. Com.* II, 225 (*Duphalmi* sp. Brouss., *Donis* sp. Less., *Jasonia* sp. DC.) et *Allagoppus* Cass. (*Jasonia* sp. DC.) a Jasonia sat differre videntur. — Sectiones generis Jasonia Chiliadensis (*Chiliadensis* Cass.) et Eujasonia (*Jasonia* Cass.) vix distincte nempe in *J. Sieula* capitula saepius subdiscoides et acheniorum pili superiores brevissimi glandulosi more *J. glutinosa*.

P. CORONOPIFOLIA Cass. sp. *Kralik Pl. Alger. select. exsicc.* [1858] n. 57.

— *Jasonia coronopifolia* Cass. in litt.

Planta perennis, saepius spithamea dumulosa, undique puberulo-glutinosa pube furfuracea, odore balsameo. Caudex lignosus, saepius pluriceps, in radicem fusiformem desinens. Caules erecti, inferne frutescentes, superne indurato-herbacei, a basi vel a medio ramosi, ramis teretibus striatis divergentibus apice monocephalis. Folia alterna, petiolata pinnatisecta laciniis linearibus crassiusculis obtusiusculis divergentibus indivisis vel bifidis vel etiam pinnatisectis, superiora indivisa lineariteretiuscula. Capitula majuscula, erecta, in corymbum laxum disposita, longiuscule pedunculata pedunculo infra capitulum undo. Involucrum campanulato-hemisphaericum, foliis exterioribus saepius 8-10 omnino foliaceis erecto-patentibus longioribus et frequentissime flosculos longe excedentibus, interioribus linearibus setis imbricatis. Flosculi albi dentibus pallide luteis. Acheniorum villi et pappus candidi. — Malo.

In Sahara Algeriensis montosis rupestribus calcareis apricis vel petrosis, necnon in alveis glareosis. In provinciae Algeriensis ditione *Mzab* frequens ad palmeta *Berriant*, *Gardaia*, *Mellilil*. — Apud Arabes *Tafet* nuncupatur.

TOURNEUXIA Cass.

Capitulum multiflorum, homocarpum. Involucri polyphylli foliola subtriseriatim imbricata, dorso tomentosa margine membranaceo-scariosa. *Receptaculum* concaviusculum, *epaleatum*. *Flosculi* ligulati, *Achenia* uniformia, *crostria*, glabra, *areola* insertionis exacte basilaris, horizontaliter patentia, *obovato-cuneata*, a dorso compressa, *utrinque* *margine* *crassiusculo* *alato*, *facie* *dorsoque* *ecostata*. *Pappus* *insertione* *obliqua* *ab* *apice* *faciei* *interioris* *achenii* *rectangulatum* *ascendens*, *uniformis*, *multisetus*, *setis* *pluriseriatis* *dense* *plumoso-barbatis* *plumulis* *intertextis*, *nonnullis* *interioribus* *paulo*

longioribus apice nudis, demum achenii faciei adpressis in planum orbiculare expansis et circumcirca radiantibus. — Planta annua, subcaulis, plus minus modice tomentosa, Saharae Algeriensis incola. Pedunculi nudi, elongati, caudiculus brevissimus foliatis terminantes. Folia mire variabilia, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata in petiolum sensim attenuata, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum abrupte contracta, integra vel grosse inaequaliterque dentata vel pinnatifida. Capitula apice pedunculorum solitaria, flosculis luteis saepe infra purpurescentibus.

Genus hoc novum Cichoracearum, fabrica peculiari acheniorum et poppi inter omnes *Scorziserias* insigne, cll. Aristidi Letourneux et Henrico Letourneux de la Perrandière, ambobus itineris nostri recentioris per Saharae Algeriensem australiorem strenuis devotisque sodalibus, amicitiae perpetuum pignus esse volumus.

T. VARIIFOLIA Coss. ap. Kralik *Pl. Alger. select. exsicc.* [1858] B. 67 et 67 bis.

Planta annua, subcaulis. Radix simplex, gracilis, descendens, caudiculus 2-3 vel plures vel plurimos emittens. Caudiculi praesertim ad apicem foliati, brevissimi et saepius arena mobili immersis et inde primo intuitu folia omnia radicalia videntur. Folia saepius late viridia, pubescenti-subtomentosa, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata sensim in petiolum attenuata integra vel Plantaginis coronopifoliae more pinnatifida, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum elongatum abrupte contracta grosse et inaequaliter dentata rarius integra. Pedunculi aphylli, esquamati, debiles, saepius 3-6 centim. longi, pubescenti-tomentosi, caudiculus et caudiculorum ramulos terminantes, per anthesim erecti vel ascendentes, dein patentes capitulis saepius in arena maturescentibus. Involucrum subcampanulatum demum campanulato-subglobosum, foliolis dorso lanato-tomentosis, ligulis brevioribus, oblongo-lanceolatis, exterioribus apice saepius arcuatis. Achenia fuscescentia, ala marginali albida. Pappus primum candidus dein sordide albidus. — Aprilis-mais.

In Saharae Algeriensis aggeribus arenae mobilis necnon in alveis exsiccatis et depressis arenoso-glaucosis. In provincia Cirtensi australiore ad *Chatt Melvir!* et ad palmetum *El Hadjira!*; in provinciae Algeriensis ditione *Mzob* haud infrequenter obvia a palmetis *Berris!* et *Guerrara!* ad *Melili!* et puteum *Hassi et Djual!* prope palmetum *Ngoussa.*

M. de Schrenfeld, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante, adressée à M. le président de la Société par M. Des Moulins :