

tiore per Saharam Algeriensem australiorem primus legit dicatum. — Perralderia differt a Jasonia foliis involucri exterioribus longioribus omnino foliaceis lineari-teretiusculis, corollis fere a basi sensim ampliatis, staminum filamentis ad imam corollam insertis, antherarum caudis subindivisis nec laceris, achæniis teretiusculis, nec oblongo-teretiusculis, a basi ad apicem dense longeque villosis villis superioribus pappum exteriorem occultantibus, apice in collum brevissimum abrupte contractis, et habitu plane alieno.

Vieræa Webb *Phyt. Can.* II, 225 (*Euphthalmi* sp. Brouss.; *Doniæ* sp. Less., *Jasoniæ* sp. DC.) et Allagopappus Cass. (*Jasoniæ* sp. DC.) a Jasonia sat differre videntur. — Sectiones generis Jasoniæ Chilladenus (*Chilladenus* Cass.) et Eujasonia (*Jasonia* Cass.) vix distinctæ nempe in J. Sicula capitula sæpius subdiscoidea et achæniorum pili superiores brevissimi glandulosi more J. glutinosæ.

P. CORONOPIFOLIA Cass. ap. Kralik *Pl. Alger. select. exsicc.* [1858] n. 57.  
— *Jasonia coronopifolia* Cass. in litt.

Planta perennis, sæpius spithamea dumulosa, undique puberulo-glutinosa pube furfuracea, odore balsameo. Caudex lignosus, sæpius pluriceps, in radicem fusiformem desinens. Caules erecti, inferne frutescentes, superne indurato-herbacei, a basi vel a medio ramosi, ramis teretibus striatis divergentibus apice monocephalis. Folia alterna, petiolata pinnatisecta laciniis linearibus crassiusculis obtusiusculis divergentibus indivisis vel bifidis vel etiam pinnatisectis, superiora indivisa lineari-teretiuscula. Capitula majuscula, erecta, in corymbum laxum disposita, longiuscule pedunculata pedunculo infra capitulum nudo. Involucrum campanulato-hemisphæricum, foliis exterioribus sæpius 8-10 omnino foliaceis erecto-patentibus longioribus et frequentissimè flosculos longe excedentibus, interioribus linearibus acutis imbricatis. Flosculi albi dentibus pallide luteis. Achæniorum villi et pappus candidi. — Maio.

In Saharæ Algeriensis montosis rupestribus calcareis apricis vel petrosis, necnon in alveis glareosis. In provinciæ Algeriensis ditione *Mزاب* frequens ad palmeta *Berriani!*, *Gardaïa!*, *Metlili!*. — Apud Arabes *Tafez* nuncupatur.

#### TOURNEUXIA Cass.

*Capitulum* multiflorum, *homocarpum*. Involucri polyphylli foliola subtriseriatim imbricata, dorso tomentosa margine membranaceo-scariosa. *Receptaculum* concaviusculum, *epaleatum*. *Flosculi* ligulati. *Achænia* uniformia, *erostria*, glabra, areola insertionis exacte basilari, *horizontaliter* patentia, *obovato-cuneata*, a dorso compressa, *utrinque* margine crassiusculo alata, facie dorsoque ecostata. *Pappus* insertione obliqua ab apice faciei interioris achæniæ *rectangulatim* ascendens, uniformis, multisetus, *setis pluriseriatis* dense plumoso-barbatis plumulis intertextis, nonnullis interioribus paulo

longioribus apice nudis, *demum achæniî faciei adpressis* in planum orbiculare expansis *et circumcirca radiantibus*. — Planta annua, subcaulis, plus minus molliter tomentosa, Saharæ Algeriensis incola. Pedunculi nudi, elongati, caudiculos brevissimos foliatis terminantes. Folia mire variabilia, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata in petiolum sensim attenuata, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum abrupte contracta, integra vel grosse inæqualiterque dentata vel pinnatifida. Capitula apice pedunculorum solitaria, flosculis luteis sæpe infra purpurascenscentibus.

Genus hoc novum Cichoracearum, fabrica peculiari achæniorum et pappi inter omnes *Scorzonereas* insigne, cll. Aristidi Letourneux et Henrico Letourneux de la Perraudière, ambobus itineris nostri recentioris per Saharam Algeriensem australiorem strenuis devotisque sodalibus, amicitiaæ perpetuum pignus esse volumus.

T. VARIIFOLIA Coss. ap. Kralik *Pl. Alger. select. exsicc.* [1858] n. 67 et 67 bis.

Planta annua, subcaulis. Radix simplex, gracilis, descendens, caudiculos 2-3 vel plures vel plurimos emittens. Caudiculi præsertim ad apicem foliati, brevissimi et sæpius arena mobili immersi et inde primo intuitu folia omnia radicalia videntur. Folia sæpius læte viridia, pubescenti-subtomentosa, in eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata sensim in petiolum attenuata integra vel Plantaginis coronopifoliae more pinnatifida, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum elongatum abrupte contracta grosse et inæqualiter dentata rarius integra. Pedunculi aphylli, esquamati, debiles, sæpius 3-6 centim. longi, pubescenti-tomentosi, caudiculos et caudiculorum ramulos terminantes, per anthesim erecti vel ascendentes, dein patentes capitulis sæpius in arena maturescentibus. Involucrum subcampanulatum demum campanulato-subglobosum, foliolis dorso lanato-tomentosis, ligulis brevioribus, oblongo-lanceolatis, exterioribus apice sæpius arcuatis. Achænia fuscescentia, ala marginali albida. Pappus primum candidus dein sordide albidus. — Aprili-maio.

In Saharæ Algeriensis aggeribus arenæ mobilis necnon in alveis exsiccatis et depressis arenoso-glareosis. In provincia Cirtensi australiore ad *Chott Melrir!* et ad palmetum *El Hadjira!*; in provinciæ Algeriensis ditione *Mzab* haud infrequenter obvia a palmetis *Berrian!* et *Guerrara!* ad *Melili!* et puteum *Hassi el Djual!* prope palmetum *Ngoussa.*

M. de Schœnefeld, secrétaire, donne lecture de la lettre suivante, adressée à M. le président de la Société par M. Des Moulins :