

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *pratense*.
 Tragopogon calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.* 382. *Fl. suec.* 648. *Mat. med.* 372. *Roy. lugdb.* 119. *Dalib. parif.* 242.
 Tragopogon pratense luteum majus. *Baub. pin.* 274.
 Tragopogon. *Fuchs hist.* 827.
Habitat in Europæ pratis apricis. ♂
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *orientale*.
 Tragopogon orientale angullifolium, flore maximo luteo. *Tournef. cor.* 36.
 Barba hirci. *Cam. epit.* 312. *figura*.
Habitat in Oriente. ♂
3. TRAGOPOGON calycibus corollæ radiis longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *porrifolium*.
Hort. upf. 243.
 Tragopogon purpuro-cæruleum, porri folio, quod Arteni vulgo. *Baub. pin.* 274. *Moris. hist.* 3. p. 8. f. 1. 9. f. 5.
 Tragopogon alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist.* 1079.
Habitat - - - ♂
4. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris, seminibus levibus: disci plumosis; radii setaceis. *hybridum*.
Hort. upf. 243. *
 Tragopogon gramineis foliis hirsutis. *Baub. pin.* 275.
 Tragopogon alterum, gramineo folio, flore suave rubente. *Col. ecphr.* 1. p. 232. t. 231. *
Habitat in Italia. ☉
5. TRAGOPOGON foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indivisis. *virginicum*.
 Tragopogon foliis lanceolatis sessilibus amplexicaulibus dentatis, caule ramoso. *Gron. virg.* 91?
Habitat

I. POLYGAMIA ÆQUALIS.

810. TRAGOPOGON.* *Vaill. A. G. 1721. 44. 13.*21. 14. *Tournef. 270. Tragopogonoïdes Vaill.**A. G. 1721. 43. 15. 14.*CAL. *Communis simplex, octophyllus: foliolis acuminatis, æqualibus; alternis interioribus; omnibus coalitis basi.*COR. *Composita imbricata, uniformis: corollulis hermaphroditis multis, exterioribus paulo longioribus.**Propria monopetala, ligulata, truncata, quinque-dentata.*STAM. *Filamenta quinque, capillaria, brevissima. Anthera cylindracea, tubulata.*PIST. *Germe oblongum, infra corollam propriam. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigmata duo, revoluta.*PER. nullum. *Calyx connivens, acuminatus, longitudine feminum, ventriculosus.*SEM. *solitaria, oblonga, utrinque attenuata, angulata, scabra, stipite subulato, longo, pappigero terminata. Pappus plumosus, planus, radice circiter triginta duobus.*REC. *Commune nudum, planum, scabrum.*ONS. *Tragopogonis Vaill. Semina recta, Calyx corolla longior. Tragopogonoides Vaill. Semina incurvata, Calyx corolla brevior.*811. SCORZONERA.* *Tournef. 269. Vaill. A.**G. 1721. 53. 13. 16. 14. Scorzoneroïdes Vaill.**A. G. 1721. figuris iisdem.*CAL. *Communis imbricatus, longus, subcylindraceus: squamis circiter quindecim.*COR. *Composita imbricata, uniformis: corollulis hermaphroditis plurimis, exterioribus paulo longioribus.**Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinque-dentata.*STAM. *Filamenta quinque, capillaria, brevissima. Anthera cylindracea, tubulata.*PIST. *Germe infra corollam propriam. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigmata duo, reflexa.*PER. nullum. *Calyx ovato-oblongus, connivens.*SEM. *solitaria, oblonga, cylindracea, striata, calyce dimidio breviora, coronata Pappo plumoso.*REC. *nudum.*ONS. *Scorzonera V. foliis integris gaudet.**Scorzoneroïdes V. foliis divisis & laciniatis est.*