

- T. calycibus corollae radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *Hort. ups.* 243. *Mill. dict. n. 3.* *Kniph. cent. 7. n. 93.* *Roth. germ. I. 332. II. 239.*
- T. foliis gramineis amplexicaulibus, calyce florem superante. *Hall. helv. n. 9.*
- T. purpureo-coeruleum, porri folio, quod Artefi vulgo. *Bauh. pin. 274.* *Moris. hist. 3. p. 8. f. 7. t. 9. f. 5.*
- T. alterum f. Barba hirci. *Dalech. hist. 1079.*
Barba hirci altera. *Cam. epit. 313.*
- β. Tragopogon folio oblongo sinuato. *Bauh. pin. 274.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 5.
Lauchblättriger Bocksbart: W.
Habitat in Helvetiae, Germaniae collibus, pratis. ♂
(v. v.)

*8. TRAGOPOGON *angustifolius.* †

- T. calycibus octophyllis corollae radio longioribus, foliis integris strictis glabris. W.
- Tragopogon angustifolius. *Bellard. in litt.*
Schmallblättriger Bocksbart. W.
Habitat in comitatu Nicaensi. ♂ (v. f.)
Similis T. crocifolio sed calyces octophylli et folia basi glabra. Caulis quadriuncialis. W.

9. TRAGOPOGON *crocifolius.*

- T. calycibus pentaphyllis corollae radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculisque basi villosis. W.
- T. calycibus corollae radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculisque basi villosis. *Sp. pl. 1110.*
Gouan. monsp. 405. Gouan. illustr. 52.
- T. purpureo-coeruleum crocifolium. *Bauh. pin. 275.*
T. croci folio montanum, flore nigro-purpureo. *Col. ecphr. 1. p. 229. t. 230.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 5.
Safranblättriger Bocksbart. W.
Habitat in Italia, Monspeli. ♂ (v. f.)
Calyces pentaphylli. Similis *T. porrifolio*, vix pedalis (nec 6-pedalis), tenera Folia basi villosa, aetate